

1. 1. Выберите показатель, по которому оценивается эффективность женской консультации?

- a) Число воспалительных заболеваний у 1000 женщин фертильного возраста
- b) Число криминальных аборт у 1000 женщин фертильного возраста
- c) Число аборт у 1000 женщин фертильного возраста
- d) Число родов у 1000 женщин фертильного возраста
- e) Число самопроизвольных выкидышей у 1000 женщин фертильного возраста

2. 2 Через два дня после употребления холодного пива пациент стал жаловаться на осиплость голоса, кашель, повышение температуры. Объективно: состояние удовлетворительное, t тела 37.5 °С. При ларингоскопии: слизистая гортани гиперемирована, голосовая щель широкая. Дыхание самостоятельное. Ваш предположительный диагноз:

- a) Острый фарингит
- b) Паратонзиллит
- c) Лакунарная ангина
- d) Острый аденоидит
- e) Острый ларингит

3. 3. В приемный покой доставлен мальчик 8 лет, который травму носа во время игры в футбол. Жалобы на боль в области носа и носовое кровотечение. Какую первую помощь вы окажете?

- a) Анемизация носа
- b) Передняя тампонада
- c) Холод на область носа
- d) Наложение працевидной повязки
- e) Задняя тампонада

4. 4. 32 летний мужчина страдающий героинной наркоманией последние 3 дня приостановил прием наркотиков. При осмотре нарколога жалуется на сильную боль во всем теле, неприятное чувство в сердце и желудке, тошноту и понос. Пациент в состоянии двигательного беспокойства, на вопросы отвечает раздражительно, постоянно просит наркотик или что-нибудь из лекарств. С чего начать лечение?

- a) Психотерапия
- b) Рефлексотерапия
- c) Психофармакотерапия
- d) Запретить психоактивные вещества
- e) Электро - судорожная терапия

5. 5. Пациент А, 23 лет, жалуется на значительный зуд, слезотечение, припухлость обоих глаз. Из анамнеза: пациент 1 день назад занимался уборкой дома. Ваш предположительный диагноз:

- a) Наследственная катаракта
- b) Серозный иридоциклит
- c) Острый приступ глаукомы
- d) Аллергический конъюнктивит
- e) Бактериальный кератит

6. 6. Выберите лекарственный препарат специфической терапии на этапе скорой неотложной помощи при эпилептическом статусе 1 стадии

- a) дексаметазон 4 мг, в\в
- b) 2.0 – 4.0 мл. фуросемида в\в
- c) 40% р-р 80 мл. глюкозы в\в
- d) 10 мг диазепам в\в
- e) витамин В-1 – 5 мл в\в

7. Резонерство характерно для:

- a) паранойяльного развития личности
- b) невроза навязчивых состояний
- c) шизофрении
- d) сосудистой деменции
- e) эпилепсии

8. Юноша 18 лет, после ЧМТ отмечает ухудшение памяти, сложности с речью, в частности в подборе слов, невозможность выполнить сложные задачи. О каком синдроме можно думать:

- a) Дементивном
- b) Астеническом
- c) Онейроидом
- d) Слабоумии
- e) Психоорганическом

9. У больного 60 лет на фоне повышения артериального давления развилась дизартрия, слабость в дистальных отделах конечностей и парестезии. Ваша тактика:

- a) Нитроглицелин, аспирин, гепарин, морфин
- b) Сальбутамол, эуфиллин, будесонид
- c) Нифедирин, фуросемид, нитроглицелин
- d) Нифедипин, эуфиллин, сульфат магния
- e) Морфин, добутамин, аспирин, физиологический раствор

10. Что из нижеперечисленного является ранней клинической характеристикой рассеянного склероза?

- a) Мышечная атрофия
- b) Алопеция
- c) Нарушение зрения
- d) Деменция
- e) Клонические судороги

11. У пациента проявление выраженной атаксии, мышечной слабости, скандированной речи, тремора. Ваш предположительный диагноз?

- a) Опухоль мозжечка
- b) Опухоль лобной доли
- c) Опухоль теменной доли
- d) Миастения
- e) Болезнь Рейно

12. На прием обратился мужчина 34 лет, ди-джей в ночном клубе, в течении 2-х дней беспокоят повышение температуру тела до 38°C, дизурия, зуд и жжение во время мочеиспускания, выделения бледно-желтого цвета из уретры с неприятным запахом. Пациент ведет беспорядочную половую жизнь. При осмотре: гиперемия и отечность губ головки полового члена. Выберите для какого заболевания характерна данная клиническая картина:

- a) Урогенитального хламидоза
- b) Урогенитального кандидоза
- c) Гарднереллеза
- d) Острой гонореи
- e) Урогенитального трихомониаза

13. 13. Пациент, 54 лет, обратился к дерматологу с жалобами на сыпь между пальцами на ногах, чувства зуда в этой области жжения. Данные жалобы отмечает в течении 2 месяцев. Не получал лечения. Работает в бане. Ваш предположительный диагноз?

- a) Вторичный сифилис
- b) Ихтиоз
- c) Эпидермофития стоп
- d) Дисгидротическая экзема
- e) Кератодермия ладоней и стоп

14. 14. Женщина обеспокоена повышением температуры до 37.9 °С, появлением боли внизу живота схваткообразного характера, жидкого стула с примесью слизи и крови до 15 раз в сутки, тенезмов, общую слабость, тошноту и рвоту. Осмотр: кожные покровы бледные. Язык сухой. При пальпации сигмовидная кишка спазмирована, резко болезненная. Пульс 98 в минуту, АД -110\70 мм рт. ст. О каком заболевании можно предположить?

- a) Брюшной тиф
- b) Холеры
- c) Острый шигеллез
- d) Сальмонеллез
- e) Острый эшерихиоз

15. 15. Определите первостепенное действие при выявлении случая заболевания вирусным гепатитом А?

- a) Госпитализировать в городскую больницу
- b) Организовать стационар на дому, проводить лечение под обязательным контролем ВОП
- c) Срочно госпитализировать в инфекционную больницу
- d) Подать экстренное извещение и госпитализировать в городскую больницу
- e) Подать экстренное извещение, госпитализировать в инфекционную больницу

16. 16. Первый признак сифилиса:

- a) Гумма
- b) Лейкодерма
- c) Твердый шанкр
- d) Аллопеция
- e) Лимфаденопатия

17. 17. Экстренное извещение по форме Н 058/у направляется в территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту регистрации заболевания в течении:

- a) 1 часа
- b) 48 часов
- c) 12 часов
- d) 24 часов
- e) 3 часов

18. У ребенка 8 лет на коже живота и верхних конечностей 2 недели назад появились высыпания, иногда сопровождающиеся легким зудом. Объективно: высыпания представлены множественными, плотными на ощупь, блестящими узелками с пупковидным вдавлением в центре цвета нормальной кожи. Ваш предположительный диагноз:
- a) контагиозный моллюск
 - b) бородавки
 - c) крапивница
 - d) плоский лишай
 - e) остроконечные кондиломы
19. Потенциальная специфическая проблема пациента при брюшном тифе:
- a) паротит
 - b) пневмония
 - c) диффузное поражение миокарда
 - d) менингит
 - e) перфорация язвы кишечника
20. Врач скорой помощи установил, что у пациентки ботулизм. Выберите вариант ответа первой медицинской помощи:
- a) введение антитоксической противоботулинической поливалентной сыворотки
 - b) промывание желудка и высокая сифонная клизма
 - c) применение сорбента внутрь – активированный уголь
 - d) инфузионно - дезинтоксикационная терапия растворами глюкозы
 - e) срочное введение хлорамфеникола в/м
21. Пациенту поставлен предварительный диагноз – ботулизм. Необходимо выполнить промывание желудка. Выберите раствор, используемый для инактивации ботулотоксина в желудочно- кишечном тракте:
- a) слабым раствором перманганата калия
 - b) 2 % раствор натрия гидрокарбоната
 - c) раствором смекты
 - d) 5 % раствор натрия гидрокарбоната
 - e) водопроводной водой
22. В инфекционное отделение городской больницы поступил пациент с жалобами на сильную головную боль, рвоту, гипертермию 39°C . Предварительный диагноз менингококковая инфекция, менингококковый менингит. Предварительный диагноз менингококковая инфекция, менингококковый менингит. При диагностики менингита выявляют менингеальные знаки, одним из которых является:
- a) ригидность затылочных мышц
 - b) симптом Падалки
 - c) симптом Штернберга
 - d) гепатоспленомегалия
 - e) симптом Розенберга
23. В инфекционную больницу поступил пациент с диагнозом дифтерия ротоглотки, пленчатая форма. В какое отделение помещают пациента после обследования?
- a) кишечное
 - b) желтушное
 - c) боксированное
 - d) диагностическое
 - e) тифозное

24. 24.Путь проникновения патогенных возбудителей в макроорганизм:

- a) входные ворота инфекции
- b) эпидемический процесс
- c) резервуар инфекции
- d) диссеминация
- e) суперинфекция

25. 25.Что отмечается у пациента брюшным тифом в период разгара?

- a) общее состояние не изменяется
- b) астеновегетативный синдром
- c) тифозный статус
- d) заторможенность и адинамия
- e) нормализация сна

26. 26.Термином «эндемия(эндемичность)» определяется:

- a) заболеваемость инфекционными болезнями, характерные для данной территории, связанные с завозными случаями
- b) заболеваемость инфекционными болезнями, характерными для данной территории, не связанной с завозными случаями
- c) заболеваемость любыми инфекционными болезнями, характерными для данной территории
- d) заболеваниями любыми зоонозными болезнями, характерные для данной территории
- e) заболеваемость любыми инфекционными болезнями, нехарактерными для данной территории

27. 27.Окончание инкубационного периода при ВИЧ- инфекции ассоциируется с:

- a) увеличением лимфатических узлов
- b) появлением кандидоза слизистых оболочек и кожных покровов
- c) появлением антител к ВИЧ
- d) резким похудением
- e) повышением температуры тела

28. 28.Тактика мед сестры приемного отделения при выявлении педикулеза:

- a) противопедикулезная обработка в санпропускнике приемного отделения
- b) направление больного в дезинфекционную станцию
- c) противопедикулезная обработка в лечебном отделении
- d) сообщение о выявленном случае педикулеза главному врачу
- e) госпитализация больного в инфекционную больницу

29. 29.Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате получения мед. помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности, называется

- a) кишечным
- b) карантинным
- c) особо опасным
- d) внутрибольничным
- e) парентральным

30. В приемный покой поступает пациент с жалобами на водянистый стул в течении 3 дней. Клинические данные: АД – 100/60 мм. рт., пульс – 98/мин, сухие слизистые оболочки. Какой раствор показан для в/в введения в данном случае?
- a) гипертонический кристаллоидный раствор
 - b) изотонический кристаллоидный раствор
 - c) коллоидный раствор
 - d) свежезамороженная плазма
31. Пациентка С. 22 лет обратилась 10 июня с жалобами на отсутствие менструации, тошноту и рвоту по утрам. Анамнез: последняя менструация 10 мая, живет регулярной половой жизнью. Объективно: состояние удовлетворительное, АД – 110/70 мм. рт. ст. При осмотре зеркалами слизистая влагалища цианотичная. Бимануально: матка увеличена до размеров гусиного яйца, безболезненная, мягкой консистенции, при пальпации уплотняется. Определите предполагаемый срок беременности и родов:
- a) Беременность 12 недель, срок родов 27 февраля
 - b) Беременность 8 недель, срок родов 17 февраля
 - c) Беременность 16 недель, срок родов 17 января
 - d) Беременность 5 недель, срок родов 7 февраля
 - e) Беременность 14 недель, срок родов 7 марта
32. В роддом поступила беременная Ф., 22 лет, со сроком 38-39 недель, рост – 150 см, вес – 58 кг. Размеры таза: 22-24-26-16.5 см, обхват живота – 103 см, высота стояния дна матки – 40 см. Положение плода продольное, предлежит головка, сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 уд/мин, прямой размер головки – 12 см. Влагалищное исследование шейки матки – «зрелая», предлежит головка, подвижна над входом в малый таз. Диагональная конъюгата – 11.5 см. Поставьте предварительный диагноз:
- a) Беременность 38-39 недель. Простой плоский таз
 - b) Беременность 38-39 недель. Общеравномерносуженный таз 1 ст.
 - c) Беременность 38-39 недель. Общеравномерносуженный таз 2 ст. Кпуный таз
 - d) Беременность 38-39 недель. Крупный плод
 - e) Беременность 38-39 недель. Общеравномерносуженный таз 1 ст. Многоводие
33. Пациентка жалуется на резкие, схваткообразные боли внизу живота, обморочное состояние, слабость, АД 90/60 мм. рт. ст. PS – 100 ударов в минуту, кожные покровы бледные, симптом Щеткина – Блюмберга положительный, отмечает задержку месячных на четыре недели, PV матка и придатки не определяются из резкой безопасности, задний свод нависает, болезненный. Что можно предположить ?
- a) разрыв селезенки
 - b) внематочную беременность прервавшейся по типу разрыва трубы
 - c) перекрут ножки кисты яичника
 - d) внематочную беременность прервавшейся по типу шеечного аборта
 - e) апорплексию яичника
34. Беременная С. 24 лет, поступила в родильный дом с жалобами на схватки, начавшиеся 4 часа назад. Объективно: состояние удовлетворительное, АД- 120/80, сердцебиение плода ясное 130 ударов в минуту, схватки по 30 секунд каждые 7-8 мин. При бимануальном исследовании шейка матки раскрыта на 6 см., плодный пузырь цел. Диагноз: Беременность 39 недель. Определите период родов:
- a) период изгнания
 - b) послеродовой период
 - c) период предвестников
 - d) период раскрытия
 - e) ранний послеродовой период

35. 35.К неотложным состояниям в гинекологии относится:

- a) апоплексия яичника, внематочная беременность
- b) внематочная беременность, преждевременные роды
- c) сальпингоофорит, эндометрит
- d) апоплексия яичника, аппендицит
- e) некроз миоматозного узла, киста яичника

36. 36.Выберите состояние, при котором возникает острая гипоксия плода

- a) врожденный порок сердца у беременной
- b) анемия беременных
- c) фетоплацентарная недостаточность
- d) курение во время беременности
- e) преждевременная отслойка плаценты

37. 37.Назовите диагностический признак многоплодной беременности:

- a) выраженная рвота беременных и тошнота
- b) признаки раннего токсикоза отсутствуют
- c) размер матки меньше и не соответствует сроку беременности
- d) размер матки больше и не соответствует сроку беременности
- e) размер матки соответствует сроку беременности

38. 38.У роженицы после отхождения околоплодных вод с меконием, родился доношенный ребенок мужского пола. Состояние ребенка тяжелое, пульс 80 ударов в минуту, мышцы атоничны, кожа бледная, ребенок не кричит. Выберите дальнейшую тактику акушерки:

- a) похлопать по спине, для освобождения дых.путей
- b) обсушить ребенка и положить на грудь матери
- c) передать ребенка неонатологу для реанимационных мероприятий
- d) самостоятельно ввести раствор адреналина
- e) обсушить, обеспечить тепло и оценить состояние в динамике

39. 39.Беременная пришла на очередной осмотр к врачу женской консультации. Срок беременности 28-29 недель. При обследовании АД – 160\100 мм. рт. ст. Имеются отеки на нижних конечностях Белок в моче – до 1 г\л. Через некоторое время женщина пожаловалась на головные боли, помутнение перед глазами, тошноту. Ваша тактика до приезда скорой?

- a) ввести раствор эуфиллина 2.4 % - 10.0 мл в\в, медленно
- b) ввести раствор сульфата магния 25% - 20.0 мл в\в, в течении 10 – 15 мин
- c) ввести раствор диазепама 10 мг в\в, медленно
- d) ввести раствор сульфата магния 25% -8.0 мл в\в, в течении 10 мин
- e) ввести раствор глюконата кальция 10% - 10 мл в\в , медленно

40. 40.При покраске крыши дома рабочий сорвался и упал на землю, прорезав при этом правую голень. Из раны изливается алая кровь. Определите вид кровотечения и способы временной остановки кровотечения:

- a) венозное, наложить тугую повязку
- b) капиллярное, наложить давящую повязку
- c) артериальное, наложить жгут
- d) паранхиматозное, ничего не предпринимать до приезда скорой помощи
- e) смешанное, холод на рану

41. 41.Характер и локализация болей при перфорации язвы желудка:

- a) интенсивные боли опоясывающего характера
- b) ноющие боли в правой подвздошной области
- c) кинжальные боли в эпигастрии
- d) приступообразные боли в правом подреберье
- e) схваткообразные боли в области пупка

42. 42.Разрыв промежности 2 степени характеризуется:

- a) разрывом стенки прямой кишки
- b) разрывом стенок влагалища
- c) разрывом мышц тазового дна
- d) разрывом кожи и заднего прохода
- e) разрывом кожи и мышц промежности

43. 43.Выберите раствор для обработки операционного поля:

- a) 0.1 % раствора нитрата серебра
- b) 1% раствор йодоната
- c) 6 % раствор перекиси водорода
- d) 0.1 % раствор фурацилина
- e) 1 % раствор хлорамина

44. 44.Вы – фельдшер СМП прибыли на место происшествия. Пациент – мужчина, 32 лет упал со 2-ого этажа недостроенного дома. Жалуется на сильную боль в левом бедре, невозможность двигаться. Пациент возбужден, пытается встать. При осмотре: на средней трети левого бедра имеется гематома, при пальпации определяется отек и деформация данной области, так же при попытке пациента встать определяется крепитация и патологическая подвижность. Тактика фельдшера в данной ситуации?

- a) обезболить наркотиком, транспортная иммобилизация, профилактика травм шока
- b) Обезболить наркотиком, транспортировать в позе лягушки на деревянном щите
- c) Обезболивание простым анальгетиком, наложение гипсовой лонгеты на бедро
- d) Обезболить наркотиком, колосовидная повязка на тазобедренный сустав
- e) Холод на место повреждения, тугая бинтовая повязка, ингаляция кислорода

45. 45.Первый патронаж новорожденного. Проведена беседа с матерью о значении грудного вскармливания. Укажите важную составляющую процесса вскармливания, которая имеет место только при естественном вскармливании.

- a) кожно – тактильный контакт матери и ребенка
- b) формирование иммунологической толерантности к антигенам пищевого рациона матери
- c) оптимальное количество и качество основным нутриентов
- d) Иммунологическая защита
- e) формирование адекватного пищевого поведения

46. 46.Выберите диагностический признак предшественников родов:

- a) регулярные частые схватки
- b) боль в эпигастрии
- c) отхождение околоплодных вод
- d) ложные схватки
- e) локальная боль в животе

47. 47.Женщина после родов жалуется на отсутствие стула в течении 7 дней. Необходимое сестринское вмешательство:

- a) провести термометрию, дать обезболивающее
- b) сделать очистительную клизму, дать рекомендации по соблюдению диеты
- c) измерить а\д , дать снотворное
- d) промыть желудок, дать успокоительное
- e) поставить газоотводную трубку, дать слабительное

48. 48.Ребенку 11 мес , поступил в детский стационар с жалобами на кашель , повышение температуры, отказ от еды, слабость. При обследовании отмечается учащенное дыхание, втяжение нижней части грудной клетки, при аускультации ослабленное дыхание. Укажите частоту дых. движений, соответствующую понятию учащенное дыхание для данного возраста:

- a) менее 28 в мин
- b) менее 40 в мин
- c) менее 60 в мин
- d) менее 50 в мин
- e) менее 70 в мин

49. 49.Пациент жалуется на затрудненное дыхание через нос. При осмотре : гематомы на коже лица. Выставлен диагноз: гематома перегородки носа. Какой метод диагностики применяется для уточнения диагноза?

- a) эндоназальная риноскопия
- b) задняя риноскопия
- c) передняя риноскопия
- d) осмотр носа через зеркало
- e) средняя риноскопия

50. 50.Женщина 48 лет, страдает ожирением, беспокоят боли в правом подреберье, иррадирующие в правую руку, в правую лопатку и шею, тошнота и рвота. Ваш предположительный диагноз?

- a) хронический панкреатит
- b) хронический колит
- c) хронический гепатит
- d) хронический гастрит
- e) хронический холецистит

51. 51.Вираз туберкулиновой пробы – это:

- a) Сомнительная проба Манту
- b) отрицательная проба Манту
- c) гиперергическая реакция Манту
- d) обнаружение микобактерий Коха в мокроте
- e) впервые положительная проба Манту

52. 52.Основу лечения физиологической желтухи новорожденного составляет:

- a) глюкоза для питья, фенобарбитал
- b) желчегонные препараты и гепатопротекторы
- c) фототерапия, грудное вскармливание
- d) в\в вливания глюкозы
- e) лечение антибиотиками

53. При каких заболеваниях отмечается утренняя скованность суставов?

- a) сахарный диабет
- b) акромегалия
- c) деформирующий остеоартроз
- d) ревматоидный артрит
- e) подагра

54. Медсестру вызвали ночью в палату к больному, у которого при каждом кашлевом толчке выделялась алая пеннистая кровь. Какое неотложное состояние развилось?

- a) пищеводное кровотечение
- b) желудочное кровотечение
- c) носовое кровотечение
- d) легочное кровотечение
- e) кровотечение из полости носа

55. Пациент 25 лет жалуется на кашель с мокротой в течении 2 недель, боли в груд. клетке, слабость, повышение температуры до 37.5, похудение. При аускультации в верхних отделах легких выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, сухие хрипы, ЧДД в минуту 24. О каком заболевании можно подумать?

- a) бронхоэктатическая болезнь
- b) туберкулез легких
- c) хронический бронхит
- d) абсцесс легких
- e) острый бронхит

56. В терапевтическое отделение пациент А, 27 лет, жалуется на кашель с трудноотделяемой мокротой, одышку, в день по несколько раз беспокоят приступы удушья. При осмотре ЧДД 32 раз в минуту, в легких выслушиваются сухие свистящие хрипы. Для какого заболевания характерны данные изменения?

- a) бронхоэктатическая болезнь
- b) пневмония
- c) бронхиальная астма
- d) хронический бронхит
- e) острый бронхит

57. У больного с язвенной болезнью 12-перстной кишки развилось кровотечение, которое сопровождается резкой слабостью, головокружением, одышкой, тахикардией до 120 ударов в 1 мин, снижением АД. Укажите объем неотложной помощи:

- a) дротаверин, кеторалак, триме
- b) сальбутамол, хлоропирамин, преднизолон
- c) дицинон, окситоцин, физиологический раствор
- d) Дицинон, аминокaproновая кислота, физиологический раствор
- e) морфин, гепарин, аспирин, физиологический раствор

58. У больного при в/в вливании появилась одышка, снижение АД, тошнота, головокружение. Выберите тактику мед. сестры в данном случае:

- a) прекратить вливание и вызвать врача
- b) продолжить вливание и вызвать врача
- c) продолжить вливание, не вызывать врача
- d) выйти из вены и вызвать врача
- e) измерить давление, не вызывать врача

59. 59. В районе обслуживания вашей больницы произошел сход поезда с рельс, большое количество людей пострадали. Одновременно в приемный покой поступает несколько человек. Кому из них следует оказать внимание в первую очередь?

- a) пациент 10 лет с обширной раной правой голени в повязки
- b) пациент 36 лет с раной грудной клетки, из которой выходит воздух
- c) пациентка 23 лет, беременная, с ушибом правой плечевой области
- d) пациент 23 лет без сознания с высоким повреждением спинного мозга
- e) пациент 78 лет с переломом предплечья

60. 60. У пациента развилась кетоцидотическая кома. Определите объем оказания неотложной помощи:

- a) морфин, фуросемид, нитроглицерин, оксигенотерапия
- b) 40 % раствор глюкозы 4-60 мл в\в
- c) морфин, нитроглицерин, гепарин
- d) дротаверин, атропин, платифиллин в\в
- e) инфузия физиологического раствора не менее 1 литра в течении первого часа