

1. Организация психиатрической помощи в РФ

В каких случаях проводится судебно-психиатрическая экспертиза?

- a. по требованию подследственных
- b. по требованию родственников
- c. по требованию правозащитных организаций
- d. по определению суда или постановлению следователя**

Госпитализация в психиатрический стационар в недобровольном порядке может быть осуществлена

- a. во всех случаях**
- b. если в силу психического заболевания беспомощен
- c. если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих
- d. если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния (ст.23 "Закона")

Диагностика психических расстройств в первую очередь основана на анализе

- a. Высказываний и поступков больных**
- b. Данных лабораторных методов обследования
- c. Мнения врачей других специальностей
- d. Обследования глазного дна
- e. МРТ

Если больной судом признан невменяемым, то он:

- a. автоматически признается недееспособным
- b. освобождается от уголовной ответственности**
- c. несет уголовную ответственность за преступление

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» действует с

- a. 1993**
- b. 1985
- c. 1968
- d. 1945
- e. 1928

Какие критерии включает формула невменяемости и недееспособности?

- a. Психиатрический.
- b. Юридический.**
- c. Социальный.
- d. Эпидемиологический.

Лицо, помещенное в психиатрический стационар в недобровольном порядке, подлежит обязательному усвидетельствованию комиссией врачей-психиатров в течение:

- a. 24 часов
- b. Двух часов
- c. 72
- d. 12 часов
- e. 48 часов**

Могут ли быть допущены в отделения психиатрической больницы представители общественных организаций, осуществляющих в соответствии со своими уставами контроль за соблюдением прав и законных интересов пациентов-

- a. Только с разрешения администрации больницы.**
- b. по просьбе родственников
- c. Категорически нет.

Могут ли психиатрические учреждения давать информацию о пациенте, содержащую врачебную тайну, другим лицам?

- a. Только близким родственникам.
- b. Любым лицам с согласия пациента.**
- c. Любым лицам.
- d. Только близким родственникам с согласия пациента.

Назовите основные виды психиатрической экспертизы:

- a. амбулаторная, стационарная
- b. трудовая, военная, судебно-психиатрическая**
- c. лечебная, диагностическая, лечебно-диагностическая
- d. экспериментально-психологическая, социальная

Основанием для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке является наличие у больного тяжелого психического расстройства, которое

- a. Приводит к выраженной социальной дезадаптации больного.
- b. Обуславливает непосредственную опасность больного для себя или окружающих.**
- c. Является причиной конфликтных отношений больного с его социальным окружением.

Основные принципы оказания психиатрической помощи

- a. Гуманность
- b. Сохранение врачебной тайны
- c. Преемственность
- d. все выше перечисленное**

Основным документом, регламентирующим действия, права и обязанности врача-психиатра при оказании помощи является:

- a. закон «О психиатрической помощи....»**
- b. уголовный кодекс
- c. конституция РФ
- d. трудовой кодекс РФ
- e. устав ЛПУ

Основным методом обследования в психиатрии является

- a. ЭхоЭГ
- b. ЭЭГ
- c. Психологическое обследование
- d. Беседа и наблюдение**
- e. КТ головного мозга

Психиатрическое освидетельствование и госпитализация взрослого больного в недобровольном порядке:

- a. разрешены при наличии согласия ближайших родственников
- b. возможны по усмотрению врача психиатра
- c. невозможны
- d. допустимы при наличии беспомощности и социальной опасности больного**
- e. возможны по требованию соседей

Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия допустимо по заявлению родственников, должностного лица или врача любой медицинской специальности:

- a. если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих**
- b. если он отказывается принимать поддерживающую терапию
- c. если он обращается в различные инстанции с жалобами

Решение на недобровольное лечение в психиатрическом стационаре определяет:

- a. прокурор
- b. суд**

- c. представитель местной исполнительной власти
- d. лечащий врач
- e. главный врач больницы

Решение о невменяемости больного может быть принято:

- a. правильны все перечисленные утверждения
- b. определением прокурора
- c. решением суда на основании заключения комиссии психиатров, проводящих экспертизу**
- d. комиссией психиатров, проводящих судебно-психиатрическую экспертизу

Что предусматривает консультативный учет в психоневрологическом диспансере?

- a. приглашение больному посетить психоневрологический диспансер
- b. осмотр больного по его инициативе**
- c. все выше перечисленное
- d. регулярное посещение врачом больного на дому

Что является обязательным условием для первичного освидетельствования психически больного, не опасного для себя и окружающих?

- a. согласие родственников
- b. просьба общественных организаций
- c. согласие больного**
- d. направление участкового врача
- e. заявление соседей

2. Расстройства восприятия и памяти

Гипермнезии характерны для депрессивного состояния?

- Верно
- Неверно**

Антероградная амнезия - это потеря памяти на события, предшествующее расстройству сознания или болезненному психическому состоянию?

- Верно
- Неверно**

Физиологическое старение памяти происходит по закону Рибо?

- Верно**
- Неверно

Псевдореминисценции - это ложные воспоминания, когда события, пережитые в прошлом, переносятся в настоящее?

- Верно**
- Неверно

Конфабуляции - это такого рода парамнезии, когда человек не может вспомнить, когда было то, или иное событие, во сне или наяву, иными словами забывается источник той или иной информации?

- Верно
- Неверно**

Иллюзии - это восприятие без объекта?

- Верно
- Неверно**

Парамнезии - это ошибочные, ложные, превратные воспоминания?

- Верно**
- Неверно

Галлюцинации - это нарушения восприятия, когда человек вследствие нарушений психической деятельности видит, слышит, ощущает то, что в реальной действительности не существует?

Верно

Неверно

Иллюзии, связанные с нарушениями психической деятельности подразделяются на: аффективные, тактильные, парафренные?

Верно

Неверно

Разновидностями метаморфопсии являются: микропсия, макропсия, полиопсия, оптическая аллестезия и оптическая буря?

Верно

Неверно

Термические, гаптические и гигрические галлюцинации - это разновидности тактильных галлюцинаций?

Верно

Неверно

Дереализация - это разновидность обонятельных галлюцинаций?

Верно

Неверно

Сенестопатии - патологические ощущения в виде возникающего в различных частях тела или внутренних органах, неприятного, а иногда очень тягостного, мучительного чувства покалывания, давления, жжения, скручивания, стягивания несвязанного с какой-либо соматической патологией?

Верно

Неверно

Искажённое восприятие схемы тела называется метаморфопсия?

Верно

Неверно

3. Расстройства мышления и эмоций

Для какого синдрома характерен мегаломанический бред?

- a. делириозный синдром
- b. парафренный синдром**
- c. аментивный синдром
- d. депрессивный синдром
- e. Кандинского-Клерамбо синдром
- f. маниакальный синдром

Для какого синдрома характерен острый чувственный бред?

- a. паранойяльный синдром
- b. астенический синдром
- c. параноидный синдром**
- d. парафренный синдром

Отметьте симптом, характерные для патологии мышления при эпилепсии

- a. резонерство
- b. ментизм
- c. инкогеренция
- d. разорванность

- e. мутизм
- f. детализация**
- g. аутистическое мышление

Какой из нижеперечисленных симптомов не укладываются в структуру синдрома Кандинского-Клерамбо?

- a. симптом "открытости мыслей" (психические автоматизмы)
- b. псевдогаллюцинации
- c. бред воздействия
- d. истинные вербальные галлюцинации**

Синдром чувственного (образного) бреда характеризуется:

- a. политематичностью бреда, выраженностью аффекта тревоги, страха**
- b. ничем из перечисленного
- c. монотематичностью бреда, повышенным фоном настроения

Для какого синдрома характерно бессвязное мышление?

- a. синдром Кандинского-Клерамбо
- b. аментивный синдром**
- c. кататонический синдром
- d. параноидальный синдром парафренный синдром

Бред ревности не может встречаться:

- a. при алкогольных психозах
- b. при неврозе навязчивых состояний**
- c. при шизофрении
- d. при сосудистых психозах

Какие патологические идеи характерны для параноидного синдрома?

- a. бредовые идеи преследования и воздействия**
- b. бредовые идеи величия и преследования
- c. навязчивые идеи
- d. сверхценные идеи ревности
- e. навязчивые страхи

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации?

- a. синдром дереализации
- b. вербальный галлюциноз
- c. астенический синдром
- d. синдром Кандинского-Клерамбо**
- e. делириозный синдром

Для параноидного синдрома характерны следующие симптомы:

- a. эхолалия, истинные галлюцинации
- b. психические автоматизмы, псевдогаллюцинации**
- c. инкогеренция мышления

Выберите симптомы, характерные для патологии мышления при шизофрении:

- a. аутистическое мышление
- b. мутизм
- c. ментизм
- d. все выше перечисленное**
- e. азорванность
- f. резонерство

Навязчивый страх (фобия) характеризуется:

- a. постоянным непрерывным характером с полным отсутствием критики

- b. обязательным переходом в бредовые идеи
- c. периодическим произвольным повторением**

Укажите характерные для ускоренного процесса мышления признаки:

- a. возникновение скачки идей, вихря мыслей и представлений**
- b. бесплодное мудрствование
- c. прикованность внимания

Возникновение синдрома сверхценных идей тесно связан с событиями:

- a. эмоционально значимыми для больного**
- b. ничем из перечисленного
- c. связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
- d. не связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен

Инкогерентное (бессвязное) мышление характерно:

- a. для депрессивного синдрома
- b. для синдрома Кандинского-Клерамбо
- c. для аментивного синдрома**
- d. для Корсаковского синдрома
- e. для делириозного синдрома

Укажите характерные для ускоренного процесса мышления признаки:

- a. бесплодное мудрствование, прикованность внимания
- b. отвлекаемость внимания, поверхностность ассоциаций, возникновение скачки идей, вихря мыслей и представлений**

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны слуховые истинные галлюцинации?

- a. синдром Кандинского-Клерамбо
- b. астенический синдром
- c. вербальный галлюциноз**
- d. паранояльный синдром

Термин "шперрунг" используется для обозначения переживания больным:

- a. внезапной остановки, обрыва мыслей**
- b. замедленного мышления
- c. возникновения чуждых мыслей
- d. скачки идей

Отметьте симптомы, характерные для патологии мышления при эпилепсии:

- a. детализация, обстоятельность, вязкость**
- b. резонерство, разорванность
- c. ментизм, инкогеренция
- d. мутизм, аутистическое мышление

Для интерпретативного бреда (бреда толкования) характерны:

- a. монотематичность бреда, внутренняя логика доказательств и систематизация бреда**
- b. политематичность бреда, отсутствие систематизации

Бредовое настроение характеризуется всем перечисленным, кроме:

- a. приобретения окружающим иного смысла
- b. психосенсорных расстройств
- c. необъяснимого мучительного беспокойства
- d. четко оформленного бреда преследования**
- e. напряженного предчувствия надвигающейся катастрофы

Синдром чувственного (образного) бреда характеризуется:

- a. ничем из перечисленного
- b. повышенным фоном настроения

- c. монотематичностью бреда
- d. выраженностью аффекта тревоги,страха**

Бредовое расстройство характеризуется:

- a. необъяснимого мучительного беспокойства
- b. четко оформленного бреда преследования**
- c. напряженного предчувствия надвигающейся катастрофы
- d. психосенсорных расстройств
- e. приобретения окружающим иного смысла

Навязчивый страх (фобия) характеризуется:

- a. обязательным переходом в бредовые идеи
- b. Критическим отношением пациента и попыткой борьбы со страхом**
- c. постоянным непрерывным характером с полным отсутствием критики

Какие из перечисленных действий и движений относятся к ритуалам?

- a. сопряженные с навязчивыми сомнениями**
- b. привычно повторяющиеся действия или движения
- c. тикозные движения

Какие из перечисленных действий и движений относятся к ритуалам:

- a. привычно повторяющиеся действия или движения
- b. тикозные движения
- c. сопряженные с навязчивыми страхами,сомнениями**

Выберите симптомы, характерные для патологии мышления при шизофрении

- a. мутизм
- b. разорванность
- c. все выше перечисленное**
- d. ментизм
- e. аутистическое мышление
- f. резонерство

Какие патологические идеи характерны для параноидного синдрома?

- a. бредовые идеи преследования и воздействия**
- b. бредовые идеи величия и преследования
- c. навязчивые страхи
- d. навязчивые идеи
- e. сверхценные идеи ревности

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации?

- a. делириозный синдром
- b. астенический синдром
- c. вербальный галлюциноз
- d. синдром дереализации
- e. синдром Кандинского-Клерамбо**
- f. синдром деперсонализации

К какому из приведенных ниже типов формальных расстройств мышления относится оторванность от реальности,погруженность в мир внутренних переживаний?

- a. болезненно ускоренное мышление
- b. болезненно замедленное мышление
- c. разорванное мышление
- d. резонерское мышление
- e. бессвязное мышление
- f. аутистическое мышление**

Термин "шперрунг" используется для обозначения переживания больным

- a. возникновения чуждых мыслей
- b. внезапной остановки, обрыва мыслей**
- c. замедленного мышления
- d. скачки идей

Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны слуховые истинные галлюцинации?

- a. синдром Кандинского-Клерамбо
- b. синдром дереализации
- c. синдром деперсонализации
- d. астенический синдром
- e. вербальный галлюциноз**

Возникновение сверхценных идей тесно связано с событиями:

- a. не связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
- b. связанными с жизнью больного, к которым больной безразличен
- c. эмоционально значимыми для больного, заполняющими его жизнь**
- d. ничем из перечисленного

4. Патология интеллекта. Олигофрения.

Врожденное слабоумие (олигофрения) проявляется:

- a. ничем из перечисленного
- b. obsессиями
- c. дебильностью**
- d. деменцией

Для болезни Дауна характерно все перечисленное, кроме:

- a. умственной отсталости в степени имбецильности у большинства больных
- b. развития болезни у женщин
- c. сохранения репродуктивных функций**
- d. развития болезни у мужчин

Из перечисленных форм олигофрении можно предупредить развитие болезни своевременным лечением новорожденного:

- a. при болезни Дауна
- b. при тяжелой врожденной гидроцефалии
- c. при фенилкетонурии**
- d. при синдроме Мартина - Белла

Максимальная задача в реабилитации больных идиотий состоит в научении:

- a. навыкам самообслуживания**
- b. простым арифметическим действиям
- c. элементарной профессии
- d. азбуке

Психозы у больных олигофрениями развиваются:

- a. в большей части случаев
- b. во всех случаях
- c. редко, при наличии дополнительных провоцирующих факторов**

Олигофрениии обусловлены недоразвитием мозга в связи:

- a. с перинатальными вредностями
- b. всем выше перечисленным**
- c. с травмами в родах
- d. с вредностями первых трех лет жизни

Этиологические факторы олигофрении в зависимости от времени воздействия разделяются:

- a. на наследственные
- b. на перинатальные и первых 3 лет жизни
- c. на внутриутробные
- d. все перечисленное верно**

К целям лечения больных дебильностью относятся:

- a. обучение в объеме программы начальной школы, воспитание**
- b. восстановление интеллекта
- c. ничего из перечисленного

В определении какого синдрома входит понятие необратимости?

- a. астенический
- b. амнестический
- c. деменция**
- d. аментивный

Характерными клиническими проявлениями дебильности являются:

- a. все перечисленное неверно
- b. слабость абстрактного мышления**
- c. слабость волевых функций
- d. аффективная неустойчивость

5. Синдромы психических расстройств. Патология сознания.

Мусситирующий (бормочущий) делирий проявляется всем перечисленным, исключая:

- a. Резкое двигательное возбуждение с агрессией**
- b. невнятное бессвязное бормотание
- c. хаотическое беспорядочное возбуждение обычно в пределах постели

Оглушение может развиваться в следствие:

- a. инволюционного психоза
- b. шизофрении
- c. интоксикаций, инфекций**

Для какого из указанных синдромов характерно внезапное начало и окончание (часто заканчивается сном), полная амнезия?

- a. аменция
- b. кататонический синдром
- c. сумеречное расстройство сознания**
- d. делирий
- e. синдром Кандинского-Клерамбо

В остром периоде черепно-мозговой травмы могут наблюдаться: а) сумеречное помрачение сознания; б) делирий; в) галлюциноз; г) систематизированный бред преследования;

- a. а, в
- b. г
- c. все верно
- d. а, б, в**
- e. б, г

Общими для всех синдромов помрачения сознания являются:

- a. нарушение отражения реального мира
- b. дезориентировка в месте и времени
- c. все выше перечисленное**

d. частичная или полная амнезия перенесенного состояния

Для делирия характерны все перечисленные психические расстройства, кроме:

- a. зрительных галлюцинаций
- b. аффективных расстройств
- c. двигательного возбуждения
- d. парейдолии

e. психических автоматизмов

Для мусситирующего делирия характерно все перечисленное, кроме:

- a. возбуждения в пределах постели
- b. бессвязного бормотания

c. гипертимии

Делириозное помрачение сознания возможно при: а) алкоголизме; б) черепно-мозговой травме; в) инфекционном заболевании; г) остром приступе шизофрении:

- a. а, в
- b. г
- c. а, б, в**
- d. б, г
- e. все верно

К синдромам помраченного сознания относятся: а) делирий; б) сумерки; в) онейроид; г) аменция:

- a. б, г
- b. а, в
- c. а, б, в
- d. г
- e. все верно**

При каком синдроме характерно преобладание зрительных устрашающих галлюцинаций ?

- a. синдром Кандинского-Клерамбо
- b. кататонический синдром
- c. делириозный синдром**
- d. паранояльный синдром
- e. онейроидный синдром
- f. аментивный синдром
- g. парафренный синдром

Для соматогенного делирия характерно: а) острое начало; б) усиление симптомов в ночное время; в) ложная ориентировка в окружающем; г) психомоторное возбуждение:

- a. а, б, в
- b. б, г
- c. все верно**
- d. г
- e. а, в

Сумеречное помрачение сознания характеризуют во всех случаях:

- a. постепенное начало в течение суток
- b. внезапное начало и критический выход**

Для какого из перечисленных психопатологических синдромов наиболее свойственна истощаемость внимания ?

- a. кататонического
- b. депрессивного
- c. маниакального
- d. астенического**
- e. параноидного

К какой психопатологической группе расстройств относится онейроидный синдром ?

- a. **помрачение сознания**
- b. патологии влечений
- c. патологии мышления
- d. выключение сознания

Онейроид представляет собой: а) пароксизмальное помрачение сознания; б) иллюзорно-галлюцинаторное помрачение сознания; в) сумеречное помрачение сознания; г) сновидно-фантастическое помрачение сознания:

- a. б, г
- b. а, б, в
- c. все верно
- d. **г**
- e. а, в

Оглушение может проявляться:

- a. **затруднением речевого контакта**
- b. повышенным эмоциональным фоном
- c. выраженными галлюцинаторными и бредовыми переживаниями

Для какого синдрома характерно грубое расстройство мышления, обусловленное нарушением синтеза ассоциаций ?

- a. делириозный синдром
- b. кататонический синдром
- c. парафренный синдром
- d. маниакальный синдром
- e. **аментивный синдром**
- f. паранояльный синдром

Какие симптомы из нижеперечисленных характерны для аменции ?

- a. **бессвязное, инкогерентное мышление**
- b. частичная амнезия
- c. систематизированный бред преследования

К какой форме расстройства сознания относится транс и сомнамбулизм?

- a. онейроидное
- b. делириозное
- c. сопорозное
- d. аментивное
- e. **сумеречное**

Укажите какой этиологический фактор играют ведущую роль в возникновении делириозных состояний ?

- a. **токсический фактор**
- b. психогенный фактор
- c. генетические фактор

6. Шизофрения

Какое нарушение психосенсорного синтеза в большей степени характерно для шизофрении?-
нарушение восприятия цвета

- a. переживание "уже виденного"
- b. нарушения схемы тела
- c. нарушение восприятия формы предметов
- d. **деперсонализация**

При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют клиническую картину заболевания?

- a. **простой форме**
- b. параноидной форме
- c. гебефренической форме
- d. кататонической форме

Для эмоциональной сферы больных шизофренией не характерно:

- a. неадекватность эмоциональных реакций
- b. амбивалентность эмоциональных реакций
- c. **приступы дисфории**
- d. прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций

Для приступа фебрильной шизофрении характерно

- a. трофические нарушения тканей
- b. повышение температуры тела
- c. **все выше перечисленное**
- d. угроза жизни больного
- e. кататонические симптомы

Парафренный синдром характеризуется:

- a. амнезией
- b. **мегаломаническим бредом**
- c. слабоумием
- d. трансами

В рамках какого заболевания чаще всего встречается кататоническая симптоматика?

- a. истерия
- b. маниакально- депрессивный психоз
- c. эпилепсия
- d. **шизофрения**

Какое из нижеперечисленных заболеваний, как правило, имеет тенденцию к регрессиентному течению?

- a. олигофрения
- b. шизофрения
- c. **травматическое поражение головного мозга**
- d. алкоголизм

Какой клинический признак свидетельствует о формировании у больного черт шизофренического дефекта?

- a. депрессивное состояние
- b. нарушение памяти
- c. появление кататонических симптомов
- d. **снижение волевой активности**

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе позитивных расстройств, встречающихся при шизофрении?

- a. эмоциональное уплощение
- b. снижение памяти
- c. гипобулия, снижение интеллекта
- d. **бред, псевдогаллюцинации**

Приступообразно-прогредиентная шизофрения характеризуется:

- a. однотипными (типа клише) приступами, только терапевтическими ремиссиями
- b. **усложнением симптоматики с очередным приступом, спонтанными ремиссиями**

Какой психопатологический синдром не встречается при шизофрении?

- a. сенестопатический
- b. синдром психического автоматизма
- c. корсаковский**
- d. апато-абулический

Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерные для шизофрении:

- a. апатия**
- b. слабодушие
- c. благодушие
- d. эйфория

Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе негативных расстройств, встречающихся при шизофрении?

- a. истинные галлюцинации, бред отношения
- b. псевдогаллюцинации, бред воздействия
- c. эмоциональное уплощение, гипобулия**

Для вялотекущей шизофрении свойственно:

- a. галлюцинаторные и бредовые расстройства, значительная глубина аффективных расстройств (психотические депрессии, мании)
- b. преимущественно неврозоподобные и психопатоподобные расстройства, медленное течение с постепенным развитием изменений личности**

Какие из перечисленных эмоциональных расстройств присущи шизофрении?

- a. слабодушие, эмоциональная лабильность
- b. эмоциональное уплощение, амбивалентность**

Какие из перечисленных нарушений мышления свойственны шизофрении?

- a. все выше перечисленное**
- b. разорванное мышление
- c. резонерское мышление
- d. аутистическое мышление

Для рекуррентной шизофрении является характерным:

- a. благоприятность течения
- b. однообразие приступов (типа клише)
- c. отчетливые аффективные расстройства
- d. все выше перечисленное**

Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно и приводит к выраженным изменениям личности?

- a. гебефреническая шизофрения**
- b. паранойяльная шизофрения
- c. параноидная шизофрения
- d. шизоаффективное расстройство

7. МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПСИХОЗ

Для маниакально-депрессивного психоза характерно:

- a. тенденция к рецидивам аффективных приступов, возможность перехода одной фазы в другую без светлого промежутка**
- b. формирование апато-абулического синдрома, возникновение депрессивной симптоматики в ответ на психотравму

К атипичным признакам МДП относятся:

- a. бред преследования, слуховые галлюцинации
- b. двигательное возбуждение
- c. бред самоуничижения

Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза характерно все перечисленное, исключая:

- a. дереализацию
- b. наличие депрессивной триады
- c. деперсонализацию
- d. идеи переоценки собственной личности
- e. идеи самообвинения

Укажите правильные утверждения относительно бредовых идей при маниакально-депрессивном психозе?

- a. характерны бредовые идеи преследования, бред носит первичный характер
- b. бредовые идеи соответствуют расстройству аффекта, бред носит вторичный характер

Чем характеризуется депрессивная фаза МДП?

- a. замедленное мышление
- b. все верно
- c. все неверно
- d. тоскливо-печальное настроение
- e. двигательная заторможенность

Сохранение трудоспособности в межприступном периоде МДП:

- a. нехарактерно
- b. характерно

Чем характеризуется маниакальная фаза МДП?

- a. повышенное, радостное настроение
- b. ускоренное мышление
- c. все неверно
- d. все верно
- e. повышенная двигательная активность

8. Эпилепсия

Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение?

- a. выключение сознания
- b. возможность прикуса языка и слизи во время припадка
- c. выраженность судорожной реакции
- d. продолжительность припадка

Выберите наиболее адекватный препарат для неотложной помощи при эпилептическом статусе:

- a. сульфат магния
- b. карбамазепин
- c. аминазин
- d. диазепам
- e. спазмолитики

Эпилептический статус характеризуется:

- a. серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков
- b. ничем из перечисленного

- c. серией следующих друг за другом больших эпилептических припадков, между которыми пациент не приходит в сознание
- d. пребыванием больного в состоянии выключенного сознания после судорожного припадка

Хронические эпилептические психозы не проявляются:

- a. галлюцинаторно-параноидными состояниями
- b. паранойяльными состояниями
- c. кататоническими расстройствами

Изменения личности при эпилепсии характеризуются следующими признаками:

- a. всем выше перечисленным
- b. полярностью отношений к окружающим (подобострастие контрастирует со злобностью и т.д.)
- c. обстоятельностью мышления
- d. педантизмом
- e. эксплозивностью

Амбулаторные автоматизмы включают в себя:

- a. ничего из перечисленного
- b. трансы, сомнамбулизм
- c. абсансы, дисфории

К генерализованным припадкам относятся:

- a. ничто из перечисленного
- b. джексоновские припадки
- c. вегетативный (диэнцефальный) припадок
- d. абсансы

Какие психопатологические проявления эпилептической болезни могут ошибочно расцениваться как соматические заболевания?

- a. сумеречное расстройство сознания
- b. большие судорожные припадки
- c. адверсивные припадки
- d. парциальные припадки

Какие из перечисленных ниже препаратов обладают противосудорожным эффектом?

- a. амитриптилин
- b. аминазин
- c. мажептил
- d. тизерцин
- e. карбамазепин (Финлепсин)

Эпилепсия - хроническое заболевание, характеризующееся следующими признаками:

- a. аффективными фазами, разделенными светлыми промежутками, нарастающим апато-абулическим дефектом
- b. разнообразными пароксизмальными расстройствами, типичными изменениями личности

Что из перечисленного имеет наибольшее значение для разграничения судорожной реакции от генерализованного судорожного припадка в рамках эпилепсии?

- a. отсутствие изменений на ЭЭГ, характерных для эпилепсии
- b. внезапность развития
- c. продолжительность припадка
- d. отсутствие амнезии
- e. {

Что из нижеперечисленного характерно для эпилептического изменения личности?

- a. гипертрофированная пунктуальность
- b. все выше перечисленное

- c. злопамятность
- d. ригидность аффекта

К какому виду припадков относятся джексоновские припадки?

- a. диэнцефальные припадки
- b. генерализованные судорожные
- c. фокальные (парциальные) судорожные**
- d. абсансы

Эпилептическая аура:

- a. все перечисленное неверно**
- b. амнезируется больным
- c. может быть разной у одного и того же больного
- d. встречаются у всех больных эпилепсией

9. Психические нарушения при травмах головного мозга, общих и нейроинфекциях, интоксикациях, физических воздействиях, соматических заболеваниях

При сахарном диабете могут возникнуть следующие психические расстройства:

- a. делирий**
- b. онейроид
- c. маниакальный синдром
- d. синдромы выключения сознания
- e. аменция

Какая патологическая реакция чаще всего встречается при возникновении соматического заболевания?

- a. кататонический синдром
- b. психорганический синдром
- c. онейроидный синдром
- d. делириозный синдром
- e. депрессивный синдром**

Для климактерического синдрома характерно все перечисленное, кроме:

- a. массивных вегетативных расстройств
- b. расстройства сна
- c. апатико-динамического синдрома**
- d. лабильности психической активности
- e. аффективной лабильности

В острой стадии эпидемического энцефалита может наблюдаться следующее:

- a. сумерки
- b. ни один из перечисленных
- c. делирий**

В отдаленном периоде интракраниальных инфекций отмечаются: а) церебростенический синдром; б) кататонический синдром; в) психорганический синдром; г) делириозный синдром:

- a. а, в**
- b. б, г
- c. все верно
- d. г
- e. а, б, в

При уремии возможны:

a. все реакции экзогенного типа

- b. преимущественно астенические состояния
- c. преимущественно психогенные расстройства
- d. только синдромы помрачения сознания

В острой стадии комариного (летне-весеннего) энцефалита наблюдаются все следующие психические расстройства, кроме:

- a. оглушения, переходящего в сопор и кому
- b. повышенной сонливости
- c. делириозного или аментивного помрачения сознания

d. синдрома Кандинского-Клерамбо

- e. эпилептиформного возбуждения

В острой стадии инфаркта миокарда могут наблюдаться психические расстройства:

a. делирий,выраженный астенический синдром

- b. онейроид,маниакальный синдром

Для пневмоний наиболее характерны:

- a. психоорганический синдром,затяжные бредовые психозы

b. синдромы помрачения сознания, астенические состояния

- c. ничего из перечисленного

Признаками группы атрофических процессов головного мозга являются:

- a. незаметное начало заболевания
- b. неуклонно прогрессирующее течение
- c. формирование тотального слабоумия в конечной стадии

d. все выше перечисленное

У ВИЧ-инфицированных возможны следующие психические расстройства:

- a. деменция
- b. ипохондрическая фиксация
- c. реактивная депрессия

d. все выше перечисленное

Делириозное помрачение сознания возможно при: а) алкогo-лизме; б) черепно-мозговой травме; в) инфекционном заболевании; г) остром приступе шизофрении:

a. а, б, в

- b. а, в
- c. б, г
- d. все верно
- e. г

Психические расстройства при эндокринных заболеваниях могут быть представлены:

- a. судорожным синдромом,истерическим неврозом

b. психоорганическим синдромом,аффективными нарушениями

В остром периоде черепно-мозговой травмы могут наблюдаться: а) сумеречное помрачение сознания; б) делирий; в) галлю-циноз; г) систематизированный бред преследования;

a. а, б, в

- b. б, г
- c. все верно
- d. г
- e. а, в

Наиболее информативным методом исследования атрофических процессов головного мозга из нижеперечисленного является:

- a. УЗИ головного мозга

b. компьютерная томография

- c. исследование ликвора
- d. ЭЭГ

10. Психические нарушения при сосудистых поражениях головного мозга. Пресенильные психозы. Атрофические психозы

Течение инволюционных бредовых психозов чаще всего носит:

- a. приступообразный характер
- b. периодический характер
- c. хронический характер**

Признаками группы атрофических процессов головного мозга являются:

- a. значимое ухудшение психического состояния при ухудшении соматического
- b. незаметное начало заболевания, волнообразное течение (периоды спонтанного улучшения и ухудшения состояния)
- c. неуклонно прогрессирующее течение, формирование тотального слабоумия в конечной стадии**

Для личностных изменений при болезни Альцгеймера с поздним началом (сенильной деменции) характерно:

- a. расторможение низших влечений, упрямство и ригидность**
- b. сужение круга интересов, эмоциональная лабильность

Для начальной стадии болезни Пика характерно:

- a. афато-агнозо-апрактический синдром, прогрессирующая амнезия, критика к болезни
- b. изменение личностных черт, эйфорический оттенок настроения**

Инволюционным депрессиям не характерно:

- a. опасны суицидами
- b. имеют тенденцию к рецидивам
- c. имеют тенденцию к затяжному течению
- d. сопровождаются бредом преследования малого размаха («кухонным бредом»)**

Афазии, апраксии, агнозии наиболее характерны для:

- a. болезни Пика
- b. все перечисленное неверно
- c. сосудистой деменции
- d. болезни Альцгеймера**

Инволюционной депрессии не характерно:

- a. депрессия с бредом Котара
- b. ажитированная депрессия
- c. депрессивно-бредовый синдром
- d. эмоциональная холодность**

Фабула инволюционных параноидов не складывается:

- a. из идеи высокого происхождения**
- b. из идей ущерба
- c. из идей отравления

Какой вид лечения инволюционных бредовых психозов обычно применяется:

- a. психотерапия
- b. нормотимики
- c. ЭСТ
- d. нейролептики**

е. антидепрессанты

Укажите личностные изменения, наиболее характерные для сенильной деменции:

а. все верно

б. расторможенность влечений

с. эгоцентризм

д. эмоциональное огрубение

11. Психогенные заболевания. Психопатии.

12. Наркомании, токсикомании. Алкоголизм, возрастные особенности. Алкогольные психозы.

Какие из перечисленных методов применяются для лечения алкоголизма?

а. сенсibiliзирующая терапия (тетурам, эспераль), использование транквилизаторов

б. нейрохирургическое лечение,

с. психотерапия, электросудорожная терапия

Клиническими особенностями образных навязчивостей являются: а) произвольность возникновения; б) чуждость сознанию, критическое отношение; в) тревожная напряженность, внутреннее беспокойство; г) стремление к их реализации:

а. б, г

б. г

с. все верно

д. а, б, в

е. а, в

Для лечения ажитированной депрессии показан:

а. мелипрамин

б. трифтазин

с. амитриптилин

Для депрессии наиболее характерны: а) психические автоматизмы; б) пониженное настроение; в) фиксационная амнезия; г) идеомоторная заторможенность:

а. г

б. б, г

с. все верно

д. а, б, в

е. а, в

Для какой формы психопатии характерна замкнутость, склонность к одиночеству?

а. паранойяльная психопатия

б. эпилептоидная психопатия

с. шизоидная психопатия

д. истерическая психопатия

е. астеническая психопатия

Инволюционной депрессии не характерно:

а. депрессивно-бредовый синдром

б. ажитированная депрессия

с. эмоциональная холодность

д. депрессия с бредом Котара

Плацебо-эффект в терапии определяется: а) фактором неожиданности; б) наркотической зависимостью; в) длительностью использования терапевтического средства (метода); г) психологической установкой пациента к предлагаемому терапевтическому средству (методу):

- a. б, г
- b. г**
- c. а, в
- d. а, б, в
- e. все верно

К критериям психогенных расстройств не относят следующее положение:

- a. с прекращением действия психической травмы симптомы редуцируются
- b. психотравма непосредственно предшествует развитию психоза
- c. чем острее психическая травма, тем тяжелее исход**
- d. содержание психоза находится в понятной связи с психотравмирующими переживаниями

Противопоказаниями к назначению транквилизаторов являются:

- a. эпилептический статус
- b. дыхательная недостаточность, миастения**
- c. ажитированная депрессия, алкогольный делирий

Для лечения алкогольного делирия можно использовать:

- a. все неверно
- b. феназепам и диазепам, витамины группы В**
- c. галоперидол, карбамазепин

К атипичным нейролептикам относят:

Выберите один ответ:

- a. оланзапин (зипрекса)
- b. азалептин (клозапин)
- c. рисполепт (рисперидон)
- d. все верно**
- e. все неверно

Что из перечисленного предпочтительнее использовать для купирования галлюцинаторно-бредового возбуждения?

- a. карбамазепин
- b. оксибутират натрия
- c. амитриптилин
- d. пирацетам
- e. галоперидол**

Какие из указанных факторов имеют решающее значение в формировании психопатий?

- a. социально-психологические факторы, наследственность**
- b. психическая травма, возраст больного
- c. все верно
- d. все неверно

Особенностью клинической картины реактивных депрессий является:

- a. верно все перечисленное
- b. триада Ясперса**
- c. суточные колебания настроения
- d. выраженные соматические признаки депрессии

Какие из нижеперечисленных групп препаратов предпочтительны для купирования психомоторного возбуждения в условиях соматического стационара?

- a. нейролептики
- b. амитриптилин
- c. барбитураты
- d. транквилизаторы**

Классификация антидепрессантов включает:

- a. производные бутирофенона, производные бензодиазефина
- b. трициклические антидепрессанты, ингибиторы моноаминоксидазы**

К побочным эффектам при лечении ноотропилем (пирацетамом) относятся:

- a. ничего из перечисленного
- b. трудности в засыпании**
- c. сонливость, заторможенность

Абстинентный синдром развивается после прекращения приема опиатов в среднем через:

- a. сутки
- b. 5-10 часов**
- c. двое суток
- d. 2-3 часа

В структуре неосложненного абстинентного (похмельного) синдрома могут наблюдаться:

- a. вегетативные дисфункции**
- b. судорожные припадки
- c. галлюцинозы

Какой вид лечения инволюционных бредовых психозов обычно применяется:

- a. антидепрессанты
- b. нейролептики**
- c. психотерапия
- d. нормотимики
- e. ЭСТ

Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке:

- a. rispoleпта
- b. циклодола**
- c. димедрола
- d. коаксила

Амитриптилин относится к антидепрессантам:

- a. трициклического ряда**
- b. тетрациклического ряда
- c. ингибиторам MAO
- d. обратного захвата серотонина

Термин "наркотическое" средство не включает в себя следующий критерий:

- a. фармакокинетический**
- b. социальный
- c. юридический
- d. медицинский

Гашишные психозы могут проявляться в форме:

- a. все верно**
- b. сумеречных расстройств сознания
- c. делириозных состояний
- d. затяжных бредовых состояний
- e. все неверно

О возможности перехода алкогольного абстинентного синдрома в металкольный психоз свидетельствует:

- a. иллюзии
- b. все неверно
- c. судорожный припадок

d. все верно

- e. нарастание тревоги
- f. углубление бессонницы

Правильная тактика в отношении больного с алкогольным делирием: а) проведение успокоительной психотерапевтической беседы; б) направление в наркологический диспансер; в) назначение амбулаторной седативной терапии; г) неотложное стационарирование в психиатрическую больницу:

- a. а, б, в
- b. все верно
- c. б, г
- d. а, в
- e. г**

Дисфория - это: а) тоскливая депрессия; б) неустойчивость настроение; в) радостное, веселое настроение; г) мрачное, раздражительно-злобное настроение:

- a. б, г
- b. все верно
- c. а, б, в
- d. г**
- e. а, в

Для какой формы психопатии характерна агрессивность в поведении?

- a. истерическая психопатия
- b. эпилептоидная психопатия**
- c. шизоидная психопатия
- d. психастеническая психопатия

Какие из перечисленных препаратов целесообразно назначить для купирования делирия:

- a. аминазин, амитриптилин
- b. бензонал, эфедрин
- c. диазепам, феназепам**

Для начальной стадии болезни Пика характерно:

К преимуществам терапии пролонгированными формами нейролептиков относятся:

- a. освобождение больного от необходимости ежедневного многократного приема лекарств**
- b. большая антипсихотическая активность
- c. меньшая вероятность возникновения побочных эффектов
- d. отсутствие побочных эффектов

Какая из нижеперечисленных наркоманий приводит к наиболее грубому интеллектуальному дефекту?

- a. опийная
- b. гашишная
- c. барбитуровая**
- d. кокаиновая

Побочные действия при лечении диазепамом включают:

- a. все перечисленное верно**
- b. релаксацию
- c. мышечную слабость
- d. сонливость

Признаками третьей стадии наркомании являются: а) систематическая форма потребления наркотика; б) падение толерантности; в) исчезновение эйфоризирующего действия наркотика; г) опасные для жизни нарушения в период абстиненции:

- a. а, б, в
- b. б, г

с. а, в

d. все верно

е. г

Синдром измененной реактивности включает все перечисленное, кроме:

а. изменения формы опьянения

b. появления абстинентного синдрома

с. изменения формы потребления одурманивающего вещества

d. исчезновения защитных реакций при передозировке

е. изменения толерантности

Укажите признаки средней степени простого алкогольного опьянения:

а. нарастающее угнетение (выключение) сознания

б. ускоренное мышление

с. амимия, мышечная атония

d. замедление мышления, дизартричность речи

К побочным действиям, связанным с применением нейролептиков относятся:

a. хронический экстрапирамидный синдром, гиперсаливация

б. гипергидроз

с. ни одно из перечисленного

Укажите наиболее типичное для алкогольной деградации эмоциональное расстройство:

а. апатия

б. амбивалентность

с. эмоциональная лабильность

d. эмоциональное огрубение

Неврозы являются:

a. психическим расстройством непсихотического уровня

б. психическим расстройством психотического уровня

с. ничем из перечисленного

Галоперидол показан для лечения:

а. депрессивного синдрома

б. астенического синдрома

с. параноидного синдрома

d. апато-булических состояний

Акцентуация характера по тревожно-мнительному типу характеризуются всем перечисленным, кроме:

а. постоянных переживаний за свое здоровье и здоровье близких

б. чрезмерной опеки своих детей

с. пониженной самооценке

d. повышенной способности заводить новые знакомства

е. большой впечатлительности

Для алкогольной полиневропатии характерно все перечисленное, кроме:

а. снижения болевой и температурной чувствительности

б. парестезии

с. наличия многочисленных трофических язв

d. болей по ходу периферических нервов

Феназепам может быть использован при лечении:

a. фобических расстройств

б. судорожного синдрома

с. корсаковского синдрома, нарушений сна

d. ажитированной депрессии

К холинолитическим побочным эффектам психотропных препаратов относятся:

- a. **увеличение внутриглазного давления,задержка мочи**
- b. острая дискинезия,запоры
- c. явления лекарственного паркинсонизма

Физическое (вторичное, компульсивное) патологического влечения к алкоголю возникает:

- a. в состоянии устойчивой ремиссии
- b. **только у больных алкоголизмом 2-3 стадии**
- c. у всех больных алкоголизмом, начиная с 1 стадии

К синдромам расстройств влечения относятся: а)дромомания; б) пиромания; в) kleптомания; г) дисморфомания:

- a. г
- b. **а, б, в**
- c. а, в
- d. б, г
- e. все верно

Что из перечисленного является ведущим в терапии неврозов?

- a. нейролептики
- b. антидепрессанты
- c. **психотерапия**
- d. транквилизаторы

Изменение состояния опьянения у наркомана характеризуется всем перечисленным, кроме:

- a. появления амнезий
- b. исчезновения седативного эффекта
- c. появления парадоксальных и извращенных психических эффектов
- d. **повышения интенсивности эйфории**
- e. исчезновения сомато-вегетативных эффектов наркотика

Больным эпилепсией запрещено работать: а) у движущихся механизмов; б) на высоте и у огня; в) водителем; г) на руководящих должностях:

- a. б, г
- b. г
- c. а, в
- d. все верно
- e. **а, б, в**

Укажите признаки легкой степени простого алкогольного опьянения:

- a. замедление ассоциативного процесса,дизартричность речи
- b. **ускоренное мышление,повышение двигательной активности**
- c. мозжечковая атаксия,амимия, мышечная атония

Укажите правильное утверждение о толерантности при 1-2 стадии наркомании:

- a. толерантность снижается
- b. толерантность не меняется
- c. **толерантность повышается**

К особенностям акцентуации характера по истероидному типу относятся все перечисленные, кроме:

- a. проникновение в психологию других
- b. потребности в признании
- c. пластичность поведения
- d. **склонности к самоанализу**
- e. эгоцентризма

Основными синдромами наркомании и токсикомании являются; а) синдром измененной реактивности; б) синдром психической зависимости; в) синдром физической зависимости; г) синдром последствий хронической наркотизации:

- a. г
- b. а, в
- c. б, г
- d. а, б, в
- e. все верно**

Селективные ингибиторы ацетилхолинэстеразы (Экселон, Реминил) применяются при:

- a. алкоголизме
- b. болезни Альцгеймера**
- c. эпилепсии
- d. лекарственном паркинсонизме

Укажите характерные признаки подросткового алкоголизма:

- a. более быстрое развитие зависимости, более быстрое развитие личностных изменений**
- b. медленное развитие зависимости, медленное развитие личностных изменений

Невроз навязчивых состояний проявляется:

- a. бредом ипохондрического содержания
- b. ничем из перечисленного
- c. развитием фобий, ритуалами**

Для какой астиненции характерны интенсивные мышечные и суставные боли, чихание, слезотечение, боли в животе и диарея ?

- a. кокаиновой
- b. опиийной**
- c. психомиметиковой
- d. барбитуровой

К невротическим синдромам относятся все перечисленные, кроме:

- a. фобического
- b. астенического
- c. психоорганического синдрома**
- d. обсессивного

Для соматических последствий алкоголизма в 3 стадии заболевания не характерен:

- a. полинейропатия
- b. жировая дистрофия печени
- c. кардиомиопатия
- d. остеопороз**

Наиболее частыми осложнениями приема средств бытовой и промышленной химии являются все, кроме:

- a. олигофрении**
- b. деменции
- c. судорожный синдром
- d. делириозные состояния

Алкоголизм представляет собой:

- a. острое отравление алкоголем
- b. вредную привычку
- c. хроническое психическое заболевание**
- d. многодневное употребление алкоголя
- e. психосоматическое заболевание

Для развития невроза первостепенное значение имеет:

- a. органическая неполноценность мозга
- b. хроническое соматическое заболевание
- c. слабость иммунной системы

d. внутриличностный конфликт

К алкогольным психозам относятся: а) делирий (белая горячка); б) фебрильная кататония; в) корсаковский психоз; г) онейроид:

- a. а, б, в

b. а, в

- c. б, г

d. г

- e. все верно

Укажите признаки тяжелой степени простого алкогольного опьянения:

- a. повышение двигательной активности

b. нарастающее угнетение (выключение) сознания, амимия, мышечная атония

- c. замедление ассоциативного процесса

d. ускоренное мышление, дизартричность речи

Побочный эффект, не свойственный аминазину:

- a. инфильтраты и флебиты в местах введения

b. гепатит

c. лихорадка

d. выраженная гипотензия

e. депрессия

Для неврастении характерны:

- a. нарушения сна

b. гиперстеническая астения

c. вегетативные расстройства

d. все перечисленное верно

e. все перечисленное неверно

f. гипостеническая астения

Инволюционным депрессиям не характерно:

- a. имеют тенденцию к затяжному течению

b. опасны суицидами

c. имеют тенденцию к рецидивам

d. сопровождаются бредом преследования малого размаха («кухонным бредом») Верно

Диагностика психопатии становится достаточно достоверной:

a. в молодом возрасте

b. в пожилом возрасте

c. в подростковом возрасте

d. в детском возрасте

Какая из перечисленных групп препаратов наиболее эффективна при лечении маскированных депрессий?

a. нейролептики

b. транквилизаторы

c. психостимуляторы

d. антидепрессанты

e. в-адреноблокаторы

Психическая зависимость при алкоголизме находит отражение:

a. все перечисленное

- b. ничего из перечисленного
- c. в обсессивном характере влечения
- d. в предвкушении предстоящего удовольствия выпить
- e. в психическом дискомфорте в случае препятствия реализации влечения

Истерические припадки могут характеризоваться всем перечисленным, кроме:

a. послеприпадного оглушения

- b. принятие страстных поз и жестов
- c. клонических судорог
- d. помрачения сознания
- e. тонических судорог

Какие из перечисленных препаратов применяются в качестве корректора при нейролептической терапии?

- a. фентанил
- b. ноотропил
- c. кофеин
- d. циклодол**
- e. реладорм

Галлюциногенный эффект может наблюдаться при употреблении: а) ЛСД (диэтиламида лизергиновой кислоты); б) барби-туратов; в) циклодола; г) транквилизаторов:

- a. б, г
- b. г
- c. а, в**
- d. все верно
- e. а, б, в

В отношении каких симптомов эффективны транквилизаторы:

- a. галлюцинации и бред
- b. сниженное настроение
- c. тревога, нарушения сна**

Назовите некоторые отличия атипичных нейролептиков по сравнению с типичными:

- a. Больше влияют на негативные симптомы шизофрении по сравнению с типичными**
- b. Вызывают гиперпролактинемию
- c. Вызывают снижение массы тела
- d. Вызывают вторичный сахарный диабет

Основным отличительным признаком простого алкогольного галлюциноза от алкогольного делирия является:

- a. длительность психоза
- b. ничего из перечисленного
- c. помрачение сознания**
- d. выраженность галлюцинаций

Какой из нижеперечисленных факторов позволяет достоверно разграничить наркоманию и наркотизм (злоупотребление)?

- a. сложившийся абстинентный синдром**
- b. частота употребления наркотиков
- c. любой из нижеперечисленных
- d. повышение толерантности
- e. отсутствие критики к злоупотреблению наркотиками

Для III стадии алкоголизма наиболее типичны все перечисленные признаки, исключая:

- a. наличие интеллектуально-мнестических нарушений

- b. утрату ситуационного контроля
- c. снижение толерантности к алкоголю
- d. высокая толерантность**

Для лечения дистимии используются:

- a. ноотропы
- b. транквилизаторы
- c. противосудорожные
- d. антидепрессанты**
- e. нейролептики

К противопоказаниям к лечению amitriptилином относятся:

- a. мерцательная аритмия
- b. все верно**
- c. гипертрофия простаты
- d. глаукома
- e. ничего из перечисленного

Для психопатий характерно:

- a. социальная дезадаптация**
- b. ничего из перечисленного
- c. снижение интеллекта

К атипичным формам опьянения относится:

- a. дисфорическое опьянение**
- b. эйфорическое опьянение
- c. патологическое опьянение

Для алкогольного абстинентного синдрома не характерно:

- a. сужение зрачков**
- b. тремор пальцев рук
- c. сухость во рту
- d. тахикардия
- e. потливость

Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке:

- a. димедрола
- b. пиразидола
- c. прозака
- d. мелипрамина**

Длительность алкогольного абстинентного синдрома составляет:

- a. около недели**
- b. не более трех дней
- c. около месяца
- d. не более суток

К этиологическим факторам невротических состояний относят:

- a. все неверно
- b. частые черепно-мозговые травмы в анамнезе
- c. все верно
- d. некоторые особенности воспитания и семейного положения**

Гашишная абстиненция характеризуется:

- a. аффективные расстройства не характерны
- b. резко выраженными аффективными расстройствами
- c. умеренно выраженными аффективными расстройствами**

Основными свойствами возбудимой психопатии являются:

- a. способность оскорблять по малейшим поводам
- b. крайняя несдержанность при конфликтных ситуациях
- c. все перечисленное верно**
- d. все перечисленное неверно
- e. выраженная агрессивность в гневе

К экстрапирамидным побочным эффектам при применении традиционных нейролептиков не относится:

- a. акатизия
- b. поздняя дискинезия
- c. атетоз**
- d. лекарственный паркинсонизм
- e. дистония

Последствиями ингаляционного употребления средств бытовой и промышленной химии детьми и подростками являются:

- a. все верно**
- b. все неверно
- c. токсическая энцефалопатия
- d. задержка психического и физического развития
- e. грубое психопатоподобное поведение
- f. некроз печени, почек, миокардиодистрофии

Для лечения больных, находящихся в кататоническом ступоре в первую очередь показаны:

- a. транквилизаторы
- b. психостимуляторы
- c. ноотропы
- d. нейролептики**
- e. антидепрессанты

Для гипокINETической формы реактивного психоза характерно:

- a. депрессивная окраска переживаний
- b. состояние резкой двигательной заторможенности, нарушение сознания**
- c. все перечисленное неверно

Акцентуация характера по гипертимному типу характеризуется всем перечисленным, кроме:

- a. доминирующее хорошее настроение
- b. подвижность мышления
- c. дисфоричность**
- d. оптимизм
- e. легкомыслие

Что из перечисленного можно использовать для купирования абстинентного синдрома в соматическом стационаре:

- a. Витамины B1, B6, C
- b. тиоловые препараты (тиосульфат натрия, унитиол)
- c. ничего из перечисленного
- d. все перечисленное**
- e. лечение транквилизаторами
- f. солевые растворы

К компульсивным действиям относятся:

- a. ритуалы**
- b. привычки
- c. кататонические расстройства

d. тики у детей

Изменение картины крови при применении психотропных препаратов чаще всего может быть вызвано:

a. азалептином (клозапином)

b. амитриптилином

c. феназепамом

d. галоперидолом

e. циклодолом

Что является наиболее эффективной терапией алкогольного бреда ревности:

a. лечение нейролептиками

b. лечение у сексопатолога

c. условно-рефлекторная терапия

d. психотерапия

Эпизодическое употребление токсикоманического или наркотического вещества, без развития зависимости, является:

a. фактором риска токсикомании, наркотизмом

b. навязчивым влечением

c. компульсивным влечением

Чертами паранойяльной психопатии являются:

a. недоверчивость, подозрительность, упорство в отстаивании своих убеждений

b. все верно

c. угрюмость, злопамятность, готовность в каждом видеть недоброжелателя

d. повышенная самооценка, эгоцентризм

e. ничего из перечисленного

Какой из препаратов относится к нейролептикам-"препаратам резерва" при терапевтической резистентности у больных шизофренией:

a. оланзапин (зипрекса)

b. клопиксол (зупентиксол)

c. азалептин (клозапин)

d. галоперидол

Бредовые идеи характеризуются; а) наличием болезненной основы для их возникновения; б) убежденностью субъекта в их истинности; в) недоступностью психологической коррекции; г) навязчивой повторяемостью:

a. все верно

b. г

c. а, б, в

d. а, в

e. б, г

Для неосложненного абстинентного синдрома характерно все перечисленное, кроме:

a. интенсивного влечения к опохмелению

b. иллюзорного восприятия

c. выраженных вегетативных расстройств

d. физического дискомфорта

Противопоказанием для назначения бензодиазепиновых транквилизаторов является:

a. гипотензия

b. алкогольный делирий

c. судорожный синдром в анамнезе

d. дыхательная недостаточность

Во II стадии заболевания форма потребления алкоголя чаще всего проявляется по типу:

- a. Постоянного пьянства на фоне высокой толерантности
- b. постоянного пьянства на фоне низкой толерантности
- c. псевдозапоев**
- d. истинных запоев

Признаками маскированной депрессии могут являться: а) функциональные соматовегетативные расстройства; б) ангедония; в) суточные и сезонные колебания самочувствия; г) изменения аппетита и полового влечения:

- a. г
- b. а, в
- c. б, г
- d. все верно**
- e. а, б, в

При формировании алкоголизма у женщин, по сравнению с мужчинами:

- a. все перечисленное неверно
- b. заболевание формируется ускоренно, хуже прогноз, ниже курабельность заболевания**
- c. соматическая патология тяжелее и развивается быстрее, чаще развиваются психозы

Какой из перечисленных нейролептиков в большей степени способен вызвать лекарственный гепатит:

- a. трифтазин
- b. аминазин**
- c. галоперидол
- d. зипрекса
- e. клопиксол

В судебно-психиатрической экспертизе неврозов следует иметь в виду, что:

- a. верно все**
- b. больные неврозами могут отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими
- c. неврозы не обуславливают криминального поведения
- d. неврозы, формируясь как реакции на ситуацию следствия и суда, могут развиваться после правонарушения

Невротические вегетативные кризы не характеризуются:

- a. развитием под действием слуховых псевдогаллюцинаций**
- b. разной длительностью состояний
- c. отсутствием стереотипности проявлений
- d. связанностью с эмоциональным напряжением

Какие из групп препаратов могут вызвать лекарственную зависимость:

- a. антидепрессанты
- b. транквилизаторы, психостимуляторы**
- c. нейролептики, ноотропы

У больных эндогенной депрессией обычно: а) настроение снижено в течение дня; б) настроение ухудшается во второй половине дня; в) настроение зависит от внешней ситуации; г) настроение снижено в первой половине дня:

- a. г**
- b. а, б, в
- c. б, г
- d. а, в
- e. все верно

Отличительными чертами абстиненции при барбитуровой наркомании являются:

- a. судорожные расстройства, тяжелое течение абстиненции**

b. слабая выраженность вегетативных расстройств, кратковременность абстиненции

Какая из перечисленных наркоманий является повышенным фактором риска заражением ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами?

- a. **эфедроновая**
- b. кокаиновая
- c. гашишная
- d. барбитуровая

К этиологическим факторам невротозов относят:

- a. все неверно
- b. **преморбидные особенности личности**
- c. родовая травма

Наиболее типичными признаками барбитуровой энцефалопатии являются все, кроме:

- a. **ускоренная двигательная активность**
- b. грубые нарушения памяти
- c. сниженная сообразительность
- d. медленная речь с ограниченным запасом слов

Назовите наиболее характерное для соматических расстройств во II стадии алкоголизма заболевание:

- a. панкреатит
- b. холецистит
- c. **цирроз печени**
- d. Гипертоническая болезнь

К преимуществам атипичных нейролептиков относят:

- a. быстрая редукция психотических симптомов
- b. **малая выраженность экстрапирамидных побочных эффектов**
- c. антидепрессивный эффект

Какие из перечисленных средств могут использоваться для купирования эпилептического статуса:

- a. аминазин
- b. **феназепам и диазепам**

К истерическим реактивным психозам относятся:

- a. пуэрилизм
- b. все неверно
- c. **все перечисленное верно**
- d. псевдодеменция
- e. истерические сумеречные помрачения сознания

Для начальной стадии алкоголизма (I стадии) характерно все перечисленное, кроме:

- a. снижения количественного контроля
- b. утраты защитного рвотного рефлекса
- c. ситуационно обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю
- d. роста толерантности в 2-4 раза
- e. **компульсивного характера влечения**

Основными характерными признаками психопатий по П.Б.Ганнушкину являются:

- a. стойкость характерологических нарушений
- b. все неверно
- c. тотальность характерологических нарушений
- d. трудность социальной адаптации
- e. **все верно**

Для какой формы психопатии характерна боязнь публичных выступлений?

- a. истерическая психопатия
- b. психастеническая психопатия**
- c. гипертимная психопатия
- d. возбудимая психопатия
- e. паранояльная психопатия
- f. эпилептоидная психопатия

Чаще всего среди алкогольных психозов встречается: а) вербальный алкогольный галлюциноз; б) алкогольная депрессия; в) алкогольный параноид; г) алкогольный делирий:

- a. б, г
- b. а, в
- c. а, б, в
- d. г**
- e. все верно

В формировании психической травмы имеет значение:

- a. все верно
- b. все неверно
- c. тяжесть психотравмирующего фактора, личностные особенности**
- d. бредовое настроение
- e. снижение интеллекта

Для истерического невроза не свойственны:

- a. полиморфизм симптоматики
- b. расстройства чувствительности
- c. двигательные расстройства
- d. галлюцинаторные расстройства**

Как осложнение задержка мочи может быть вызвана при назначении:

- a. пиразидола
- b. amitриптилина**
- c. прозака
- d. леривона

Для лечения больных опиоидной (героиновой) наркоманией используют все, кроме:

- a. купирование абстинентных явлений
- b. личностно-ориентированная психотерапия
- c. суггестивные методы (внушение, гипноз, «кодирование» и пр.)**
- d. лечение аффективных расстройств (использование нормотимиков и антидепрессантов)

К симптомам интоксикации кокаином относятся все перечисленные, кроме:

- a. раздражительности, беспокойства
- b. ощущения повышенных возможностей
- c. выраженной эйфории
- d. отрешенности**
- e. гиперактивности

Навязчивые состояния могут проявляться следующими феноменами: а) навязчивыми мыслями — обсессиями; б) навязчивыми страхами - фобиями; в) навязчивыми действиями - компульсиями; г) навязчивыми сновидениями - сомнофобиями:

- a. а, в
- b. а, б, в**
- c. г
- d. все верно
- e. б, г

Психическое (первичное, обсессивное) влечение к алкоголю в I стадии алкоголизма:

a. не связано с ситуациями традиционного употребления алкоголя, не сопровождается борьбой мотивов

b. ситуационно обусловлено, сопровождается борьбой мотивов

Укажите НАИМЕНЕЕ характерный для деградации опийного наркомана признак:

a. лживость

b. суицидальное поведение

c. истероформное поведение

d. снижение памяти

e. эгоцентризм

Наиболее частыми признаками опийного опьянения являются все перечисленные, кроме:

a. миоза

b. дизартричности речи

c. галлюцинаций

d. эйфории

Содержание бреда острого алкогольного параноида обычно представлено:

a. бредом Котара

b. бредом преследования

c. "кухонным бредом"

d. бредом ревности

13. Лечение

Побочный эффект, не свойственный аминазину:

a. лихорадка

b. инфильтраты и флебиты в местах введения

c. гепатит

d. выраженная гипотензия

e. депрессия

К этиологическим факторам невротических состояний относят:

Правильный ответ: некоторые особенности воспитания и семейного положения
¬частые черепно-мозговые травмы в анамнезе
¬все верно
¬все неверно

Основными характерными признаками психопатий по П.Б.Ганнушкину являются:

Правильный ответ: ¬тотальность характерологических нарушений
¬стойкость характерологических нарушений
¬трудность социальной адаптации

Основными характерными признаками психопатий по П.Б.Ганнушкину являются:

Правильный ответ: ¬тотальность характерологических нарушений
¬стойкость характерологических нарушений
¬трудность социальной адаптации

Невротические вегетативные кризы не характеризуются:

Правильный ответ: ¬связанностью с эмоциональным напряжением
¬отсутствием стереотипности проявлений
¬разной длительностью состояний

Истерические припадки могут характеризоваться всем перечисленным, кроме:

Правильный ответ: ¬помрачения сознания

Какой из перечисленных нейролептиков в большей степени способен вызвать лекарственный гепатит:

a. клопиксол

b. аминазин

- c. трифтазин
- d. зипрекса
- e. галоперидол

К невротическим синдромам относятся все перечисленные, кроме:

Правильный ответ: фобического астенического

Для развития невроза первостепенное значение имеет:

Правильный ответ: хроническое соматическое заболевание

К побочным эффектам при лечении ноотропилем (пирацетамом) относятся:

- a. трудности в засыпании**
- b. ничего из перечисленного
- c. сонливость, заторможенность

В формировании психической травмы имеет значение:

Правильный ответ: тяжесть психотравмирующего фактора, личностные особенности снижение интеллекта бредовое настроение все верно все неверно

Для лечения ажитированной депрессии показан:

- a. мелипрамин
- b. amitриптилин**
- c. трифтазин

К преимуществам атипичных нейролептиков относят:

- a. малая выраженность экстрапирамидных побочных эффектов**
- b. быстрая редукция психотических симптомов
- c. антидепрессивный эффект

Особенностью клинической картины реактивных депрессий является:

Правильный ответ: суточные колебания настроения

Назовите некоторые отличия атипичных нейролептиков по сравнению с типичными:

- a. Вызывают гиперпролактинемию
- b. Вызывают вторичный сахарный диабет
- c. Больше влияют на негативные симптомы шизофрении по сравнению с типичными**
- d. Вызывают снижение массы тела

Акцентуация характера по гипертимному типу характеризуется всем перечисленным, кроме:

Правильный ответ: доминирующее хорошее настроение оптимизм подвижность мышления легкомыслие

Побочные действия при лечении диазепамом включают:

- a. релаксацию
- b. сонливость
- c. мышечную слабость
- d. все перечисленное верно**

Основными свойствами возбудимой психопатии являются:

Правильный ответ: способность оскорблять по малейшим поводам выраженная агрессивность в гневе крайняя несдержанность при конфликтных ситуациях все перечисленное неверно

К побочным действиям, связанным с применением нейролептиков относятся:

- a. хронический экстрапирамидный синдром, гиперсаливация**
- b. гипергидроз
- c. ни одно из перечисленного

К побочным эффектам при лечении ноотропилем (пирацетамом) относятся:

- a. ничего из перечисленного
- b. трудности в засыпании**
- c. сонливость, заторможенность

Диагностика психопатии становится достаточно достоверной:

Правильный ответ: ¬в детском возрасте ¬в подростковом возрасте

Для лечения алкогольного делирия можно использовать:

- a. все неверно
- b. галоперидол, карбамазепин
- c. феназепам и диазепам, витамины группы В**

Для лечения больных, находящихся в кататоническом ступоре в первую очередь показаны:

- a. транквилизаторы
- b. психостимуляторы
- c. антидепрессанты
- d. ноотропы
- e. нейролептики**

Для психопатий характерно:

Правильный ответ: ¬снижение интеллекта

Какие из групп препаратов могут вызвать лекарственную зависимость:

- a. транквилизаторы, психостимуляторы**
- b. нейролептики, ноотропы
- c. антидепрессанты

Невроз навязчивых состояний проявляется:

Правильный ответ: развитием фобий, ритуалами ¬бредом ипохондрического содержания ¬ничем из перечисленного

К экстрапирамидным побочным эффектам при применении традиционных нейролептиков не относится:

- a. поздняя дискинезия
- b. акатизия
- c. лекарственный паркинсонизм
- d. атетоз**
- e. дистония

К противопоказаниям к лечению амитриптилином относятся:

- a. все верно**
- b. глаукома
- c. мерцательная аритмия
- d. ничего из перечисленного
- e. гипертрофия простаты

К этиологическим факторам неврозов относят:

преморбидные особенности личности ¬родовая травма ¬все неверно

Для истерического невроза не свойственны:

Правильный ответ: ¬полиморфизм симптоматики ¬расстройства чувствительности ¬двигательные расстройства

Для гипокINETической формы реактивного психоза характерно:

Правильный ответ: состояние резкой двигательной заторможенности, нарушение сознания
–депрессивная окраска переживаний –все перечисленное неверно

Неврозы являются:

Правильный ответ: психическим расстройством непсихотического уровня –психическим расстройством психотического уровня –ничем из перечисленного

Для какой формы психопатии характерна боязнь публичных выступлений?

Правильный ответ: –возбудимая психопатия –паранойальная психопатия

Какие из указанных факторов имеют решающее значение в формировании психопатий?

Правильный ответ: –психическая травма, возраст больного –социально-психологические факторы, наследственность –все верно –все неверно

Для неврастении характерны:

Правильный ответ: –гиперстеническая астенция –типостеническая астенция –вегетативные расстройства –нарушения сна

К компульсивным действиям относятся:

Правильный ответ: –кататонические расстройства

К критериям психогенных расстройств не относятся следующие положения:

Правильный ответ: –содержание психоза находится в понятной связи с психотравмирующими переживаниями –психотравма непосредственно предшествует развитию психоза –с прекращением действия психической травмы симптомы редуцируются

Для неврастении характерны:

Правильный ответ: –гиперстеническая астенция –типостеническая астенция –вегетативные расстройства –нарушения сна

Акцентуация характера по тревожно-мнительному типу характеризуются всем перечисленным, кроме:

Правильный ответ: –большой впечатлительности –постоянных переживаний за свое здоровье и здоровье близких

В судебно-психиатрической экспертизе неврозов следует иметь в виду, что

–неврозы не обуславливают криминального поведения –больные неврозами могут отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими –неврозы, формируясь как реакции на ситуацию следствия и суда, могут развиваться после правонарушения

К невротическим синдромам относятся все перечисленные, кроме

–фобического –астенического

Для какой формы психопатии характерна агрессивность в поведении?

эпилептоидная психопатия –психастеническая психопатия –истерическая психопатия –шизоидная психопатия

К истерическим реактивным психозам относятся:

–истерические сумеречные помрачения сознания –псевдодеменция –пуэрилизм

Что из перечисленного является ведущим в терапии неврозов?

–нейролептики –транквилизаторы –антидепрессанты

Чертами паранойальной психопатии являются:

Правильный ответ: –недоверчивость, подозрительность, упорство в отстаивании своих убеждений –угрюмость, злопамятность, готовность в каждом видеть недоброжелателя –повышенная самооценка, эгоцентризм

Чертами паранойяльной психопатии являются:

–недоверчивость, подозрительность, упорство в отстаивании своих убеждений –угрюмость, злопамятность, готовность в каждом видеть недоброжелателя –повышенная самооценка, эгоцентризм

Что из перечисленного является ведущим в терапии неврозов?

–нейролептики –транквилизаторы –антидепрессанты

К особенностям акцентуации характера по истероидному типу относятся все перечисленные, кроме:

–потребности в признании –эгоцентризма

Для какой формы психопатии характерна замкнутость, склонность к одиночеству?

–астеническая психопатия –паранойяльная психопатия –истерическая психопатия

К особенностям акцентуации характера по истероидному типу относятся все перечисленные, кроме:

14. Медицинская психология

Пассивность,чрезмерная чувствительность,пессимизм,низкая самооценка,способность к сочувствию и сопереживанию характерны для

- a. все неверно
- b. флегматика
- c. холерика
- d. сангвиника

e. меланхолика

Причиной органического дефекта личности являются

- a. асфиксии
- b. травмы
- c. интоксикации
- d. инфекции

e. все перечисленное

Циклотимик,по классификации Кречмера,отличается всем,кроме

- a. склонностью к колебаниям настроения от пессимизма и хандры до воодушевления и инициативности
- b. ценящий комфорт и жизненные удовольствия
- c. умеющий оказать помощь и поддержку
- d. общительностью,открытостью

e. злопамятностью,мстительностью

Термин "стеничность"означает

- a. упорство и неутомимость**
- b. осторожность и аккуратность
- c. любовь к искусству
- d. оптимизм и свободолюбие
- e. замкнутость и пассивность

Шизофренический дефект личности проявляется

- a. ухудшением памяти и понимания
- b. эгоцентризмом и стремлением к бытовому комфорту
- c. всем перечисленным
- d. пассивностью и бедностью эмоций**
- e. взрывчатостью и отходчивостью

Личностный дефект- это

- a. все ответы верны
- b. изменение поведения вследствие ухудшения памяти и понимания
- c. прогрессирующая утрата прежних интересов
- d. закрепление в поведении существовавших болезненных стереотипов
- e. коренное преобразование личности вследствие тяжелого психического заболевания**

Личности,которые,несмотря на ряд черт,существенно отличающих их от большей части популяции,сохраняют достаточную способность к адаптации,называют

- a. рационально-логическими
- b. патологичными
- c. акцентуированными**
- d. стеничными
- e. гармоничными

Флегматик характеризуется всем,кроме

- a. может долго помнить обиду
- b. отходчив и может простить обиду**
- c. слабо реагирует на замечания окружающих,не любит перемен в жизни
- d. спокойствием,терпеливостью
- e. постоянством и настойчивостью,временами упрямством

Шизотимик,по классификации Кречмера,отличается всем,кроме

- a. замкнутостью,внутренней противоречивостью
- b. общительностью,открытостью**
- c. независимостью взглядов
- d. колебанием эмоций от холодного безразличия до экстатической восторженности
- e. неожиданными реакциями на внешние стимулы

Патологическое развитие личности - это

- a. закрепление в поведении существовавших болезненных стереотипов**
- b. изменение поведения вследствие ухудшения памяти и понимания
- c. прогрессирующая утрата прежних интересов
- d. все ответы верны
- e. коренная ломка прежних личностных черт

Эпилептотимик,по классификации Кречмера,отличается всем,кроме

- a. целеустремленностью,честолюбивостью
- b. впечатлительностью**
- c. мелочен,придирчив
- d. немного завистлив,злопамятен,мстителен
- e. смелостью,решительностью

Человека,характеризующегося замкнутостью,склонностью к самоанализу,безразличием к происходящему вокруг,называют

- a. истеротимиком
- b. холериком
- c. астеником
- d. интровертом**
- e. циклоидом

Характером в психологии называют

- a. совокупность устойчивых мотивов (потребностей),ориентирующих деятельность личности в самых различных ситуациях.
- b. комплекс относительно устойчивых,биологически обусловленных характеристик,описывающих динамику протекания психических процессов человека.

с. психологические особенности человека, определяющие его успешность в приобретении знаний, умений и навыков.

d. стойкое сочетание социально значимых качеств человека, характеризующее неповторимый склад его индивидуальных свойств, типичные формы эмоциональных реакций и поведения, представленные в предметной деятельности и общественных отношениях.

e. устойчивая система личностных качеств индивида, определяющая типичные для него поступки.

Психиатрия -

a. обширная отрасль гуманитарных научных знаний о душевном состоянии человека, его поведении в самых различных обстоятельствах (воспитание, общение, обучение, творчество, труд, отдых, чрезвычайная ситуация, болезнь и т.д.).

b. процесс, целью которого является облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности.

с. специальный раздел психологии, изучающий поведение пациентов и медицинских работников в процессе оказания медицинской помощи.

d. область медицинских научных знаний и врачебных практических умений, необходимых для помощи пациентам, которые в связи с болезненным душевным состоянием испытывают страдания или трудности в приспособлении к жизни в обществе.

e. лечение различных заболеваний и расстройств посредством слова, беседы, эмоционального взаимодействия.

Личностью в психологии называют

a. комплекс относительно устойчивых, биологически обусловленных характеристик, описывающих динамику протекания психических процессов человека.

b. совокупность устойчивых мотивов (потребностей), ориентирующих деятельность личности в самых различных ситуациях.

с. устойчивая система личностных качеств индивида, определяющая типичные для него поступки.

d. психологические особенности человека, определяющие его успешность в приобретении знаний, умений и навыков.

e. стойкое сочетание социально значимых качеств человека, характеризующее неповторимый склад его индивидуальных свойств, типичные формы эмоциональных реакций и поведения, представленные в предметной деятельности и общественных отношениях.

Медицинская психология -

a. область медицинских научных знаний и врачебных практических умений, необходимых для помощи пациентам, которые в связи с болезненным душевным состоянием испытывают страдания или трудности в приспособлении к жизни в обществе.

b. специальный раздел психологии, изучающий поведение пациентов и медицинских работников в процессе оказания медицинской помощи.

с. процесс, целью которого является облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности.

d. обширная отрасль гуманитарных научных знаний о душевном состоянии человека, его поведении в самых различных обстоятельствах (воспитание, общение, обучение, творчество, труд, отдых, чрезвычайная ситуация, болезнь и т.д.).

e. лечение различных заболеваний и расстройств посредством слова, беседы, эмоционального взаимодействия.

Атлетическое телосложение чаще всего сочетается с темпераментом

a. эпилептоидным

b. нет правильного ответа

с. циклоидным

d. шизоидным

e. истероидным

Эпилептоидный темперамент характеризуется

a. инфантильностью и впечатлительностью

- b. чувствительностью и пессимизмом
- c. задумчивостью и замкнутостью
- d. смелостью и злопамятностью**
- e. щедростью и гедонизмом

Мнительность, тревожность, низкая самооценка, доверчивость и усидчивость характерны для личностей

- a. педантичных**
- b. застревающих
- c. дистимических
- d. интровертированных
- e. демонстративных

Способностями в психологии называют

- a. совокупность устойчивых мотивов (потребностей), ориентирующих деятельность личности в самых различных ситуациях.
- b. психологические особенности человека, определяющие его успешность в приобретении знаний, умений и навыков.**
- c. устойчивая система личностных качеств индивида, определяющая типичные для него поступки.
- d. комплекс относительно устойчивых, биологически обусловленных характеристик, описывающих динамику протекания психических процессов человека.
- e. стойкое сочетание социально значимых качеств человека, характеризующее неповторимый склад его индивидуальных свойств, типичные формы эмоциональных реакций и поведения, представленные в предметной деятельности и общественных отношениях.

Преобладание первой сигнальной системы предполагает

- a. тревожность и мнительность
- b. замкнутость и недоверчивость
- c. упрямство и настойчивость
- d. эмоциональность и впечатлительность**
- e. альтруизм и гедонизм

Направленностью в психологии называют

- a. комплекс относительно устойчивых, биологически обусловленных характеристик, описывающих динамику протекания психических процессов человека.
- b. психологические особенности человека, определяющие его успешность в приобретении знаний, умений и навыков.
- c. совокупность устойчивых мотивов (потребностей), ориентирующих деятельность личности в самых различных ситуациях.**
- d. стойкое сочетание социально значимых качеств человека, характеризующее неповторимый склад его индивидуальных свойств, типичные формы эмоциональных реакций и поведения, представленные в предметной деятельности и общественных отношениях.
- e. устойчивая система личностных качеств индивида, определяющая типичные для него поступки.

Люди с застревающим характером проявляют

- a. интерес к математике и философии
- b. любовь к искусству
- c. недоверчивость и упрямство**
- d. вспыльчивость и отходчивость
- e. стремление находиться в центре внимания

Основными задачами психиатрии являются

- a. все ответы верны**
- b. профилактика психических заболеваний
- c. лечение психических заболеваний
- d. своевременная диагностика психических расстройств
- e. реабилитация душевнобольных, возвращение их к полноценной жизни в обществе

Темпераментом в психологии называют

а. психологические особенности человека, определяющие его успешность в приобретении знаний, умений и навыков.

б. комплекс относительно устойчивых, биологически обусловленных характеристик, описывающих динамику протекания психических процессов человека.

с. стойкое сочетание социально значимых качеств человека, характеризующее неповторимый склад его индивидуальных свойств, типичные формы эмоциональных реакций и поведения, представленные в предметной деятельности и общественных отношениях.

д. совокупность устойчивых мотивов (потребностей), ориентирующих деятельность личности в самых различных ситуациях.

е. устойчивая система личностных качеств индивида, определяющая типичные для него поступки.

15. Внутренняя картина болезни

Внутренняя картина болезни определяется

а. типом личности пациента

б. возрастом больного

с. отношением к данному заболеванию в обществе

д. всем перечисленным

е. этапом течения болезни

Выраженная анозогнозия чаще бывает следствием

а. психического заболевания

б. высокой силы воли

с. интраверсии

д. стремления получить выгоду

е. эгоцентризма

К сознательному искажению образа болезни относят

а. аназогнозию

б. ипохондрию

с. нозофилию

д. алекситимию

е. диссимуляцию

Отсутствие чувства болезни, полное отрицание самого факта ее существования, уверенность в своем здоровье и благополучии-это

а. анозогнозия

б. симуляция

с. гипозозгнозия

д. аггравация

е. гипернозогнозия

Симуляция-это

а. намеренное усиление и демонстрация признаков имеющегося расстройства в расчете на получение выгод и льгот

б. отсутствие чувства болезни, полное отрицание самого факта ее существования, уверенность в своем здоровье и благополучии

с. намеренное сокрытие имеющихся расстройств, вызванное опасениями за свою судьбу

д. недооценка тяжести заболевания, избегание лечения, принижение степени влияния болезни на обыденную жизнь

е. намеренная и целенаправленная демонстрация признаков несуществующей болезни

Внутренняя картина болезни включает в себя все, кроме

а. объективные проявления, которые можно исследовать с помощью специальных методов и приборов

- b. знания о болезни и личный опыт
- c. сумму болезненных ощущений
- d. эмоциональные чувства в отношении болезни
- e. действия по преодолению болезни

Анозогнозия характерна для больных с

- a. бредовым синдромом
- b. все перечисленное верно**
- c. маниакальным синдромом
- d. деменцией
- e. алкоголизмом

Демонстративные личности часто реагируют на болезнь путем

- a. манипуляции**
- b. боязни огласки
- c. отрицания
- d. депрессии
- e. индифферентности

Этап пассивной адаптации характеризуется

- a. депрессией**
- b. эйфорией
- c. всем перечисленным
- d. индифферентностью (неверно)
- e. паникой

Внутреннюю картину болезни можно охарактеризовать, исследуя

- a. все перечисленное
- b. кислотно-щелочное состояние
- c. отношение пациента к своей болезни**
- d. частоту сердечных сокращений
- e. соотношение роста и массы тела

Гипонозогнозия-это

- a. переоценка тяжести и опасности имеющихся расстройств, ошибочное признание болезнью феноменов, являющихся в действительности нормальными, неверие в выздоровление
- b. недооценка тяжести заболевания, избегание лечения, принижение степени влияния болезни на обыденную жизнь**
- c. намеренная и целенаправленная демонстрация признаков несуществующей болезни
- d. отсутствие чувства болезни, полное отрицание самого факта ее существования, уверенность в своем здоровье и благополучии
- e. намеренное сокрытие имеющихся расстройств, вызванное опасениями за свою судьбу

К невольному, бесцельному искажению образа болезни относят

- a. диссимуляцию
- b. аггравацию
- c. анозогнозию**
- d. симуляцию
- e. нозофилию

Чрезмерное внимание к своему физическому здоровью, поиск у себя несуществующего соматического заболевания, называют

- a. аггравацией
- b. манипуляцией
- c. гипонозогнозией

d. диссимуляцией

e. ипохондрией

Период активной адаптации к болезни обычно характеризуется наличием

a. подозрением о возможном заболевании

b. индифферентности

c. паники

d. депрессии

e. эйфории

Для тревожно-мнительного типа акцентуации личности обычно не характерна реакция на болезнь в виде

a. тревоги

b. манипуляции

c. боязни огласки

d. демонстрации занятости (неверно)

e. ипохондрии

Замечено, что ишемической болезнью чаще страдают люди

a. нуждающиеся в ласке и опеке

b. стремящиеся к карьерному росту и нетерпеливые

c. мазохистичные и зависимые от лидера

d. аккуратные и опрятные

e. осторожные и боязливые

Низкая способность к выражению своих чувств, снижение умения делиться своими ощущениями с окружающими называют

a. конверсией

b. соматизацией

c. фрустрацией

d. алекситимией

e. анозогнозией

Пунктуальные, застенчивые, склонные к навязчивостям и интеллектуальной деятельности люди чаще болеют

a. язвенным колитом

b. ишемической болезнью сердца

c. атопической бронхиальной астмой

d. мигренью

e. гипертонической болезнью

К личностно обусловленным расстройствам (по М.Блейлеру) относится

a. сексуальные дисфункции

b. нейродермит

c. язвенная болезнь

d. атопическая бронхиальная астма

e. ожирение

Чаще подвержены кожным заболеваниям, зуду люди

a. осторожные и боязливые

b. мазохистичные и зависимые от лидера (неверно)

c. аккуратные и опрятные

d. стремящиеся к карьерному росту и нетерпеливые

e. нуждающиеся в ласке и опеке

Отмечается, что травмы чаще возникают у людей

a. непредусмотрительных, склонных к импульсивным поступкам

- b. пассивных, тревожно-мнительных
- c. педантичных, интровертированных
- d. с эмоциональной незрелостью и слабой волей
- e. все варианты верны

К психосоматическим дисфункциям (по М.Блейлеру) относится

- a. расстройства дыхания
- b. функциональные нарушения сердечного ритма
- c. все перечисленное**
- d. психогенная боль
- e. дизурии

К типам психосоматических расстройств по М.Блейлеру относят

- a. ничего из перечисленного
- b. личностно обусловленные расстройства
- c. психосоматические дисфункции
- d. психосоматозы
- e. все перечисленное**

Педантичные, стремящиеся к доминированию, честолюбивые люди чаще подвержены

- a. атопической бронхиальной астме
- b. язвенной болезни желудка
- c. мигрени**
- d. ишемической болезни сердца
- e. язвенному колиту

Гипонозогнозия проявляется

- a. депрессией, индифферентностью
- b. поиском виновного, демонстрацией занятости
- c. манипуляциями, раздражительностью
- d. боязнью огласки и осуждения, тревогой
- e. индифферентностью, демонстрацией занятости**

Понятие "внутренняя картина болезни" ввел

- a. Р.А.Лурия**
- b. В.П.Сербский
- c. Э.Крепелин
- d. С.С.Корсаков
- e. А.Гольдшейдер

Для гипотимного типа акцентуации личности чаще характерна реакция на болезнь в виде

- a. нозофилии, боязни огласки (неверно)
- b. индифферентности, ипохондрии
- c. депрессии, тревоги**
- d. отрицания, демонстрации занятости
- e. манипуляции, раздражительности

Особую настороженность должны вызывать у врача пациенты, реагирующие на болезнь

- a. тревогой
- b. депрессией**
- c. манипуляцией
- d. раздражительностью
- e. поиском виновного (неверно)

Реакция на болезнь по типу поиска виновных характерна для следующего типа акцентуации личности

- a. интровертированного

b. застревающего

- c. демонстративного
- d. возбудимого
- e. гипертимного

К психосоматозам (по М.Блейлеру) относятся все, кроме

a. психогенной боли

- b. ревматоидного артрита (неверно)
- c. нейродермита
- d. гипертонической болезни
- e. язвенного колита

Блокаду доминирующих потребностей называют

- a. конверсией (неверно)

b. фрустрацией

- c. симуляцией
- d. соматизацией
- e. алекситимией

Сильнее всего с низкой выносливостью коррелирует

a. чувство одиночества

- b. удовлетворенность своей работой
- c. религиозность
- d. осторожность, страх перемен (неверно)
- e. наличие внутреннего локуса контроля

Люди испытывающие внутреннее напряжение, завистливые и обидчивые, неспособные получать удовольствие от жизни чаще страдают

- a. кожными заболеваниями
- b. мигренью (неверно)
- c. язвенной болезнью
- d. гипертонической болезнью
- e. атопической бронхиальной астмой

Низкой выносливостью по отношению к стрессу отличаются люди

- a. с внутренним локусом контроля
- b. религиозные
- c. любящие стабильность и отсутствие перемен
- d. из многодетных семей
- e. увлеченные своей работой

Высокая выносливость коррелирует с

- a. религиозностью
- b. внутренним локусом контроля
- c. убежденностью в важности и значимости собственной деятельности, истинности поставленных целей
- d. всем вышеперечисленным
- e. широкими социальными связями, наличием семьи и друзей

К факторам, повышающим устойчивость к стрессу не относится

- a. удовлетворенность своей работой
- b. религиозность
- c. внутренний локус контроля
- d. осторожность, страх перемен
- e. широкие социальные связи, наличие семьи и друзей

16. Психология лечения, психология врача.

Повышенный риск синдрома эмоционального выгорания связывают с

- a. быстрым карьерным ростом
- b. излишне демократичным стилем руководства
- c. монотонностью труда**
- d. всем перечисленным
- e. чрезмерным практицизмом работников

Попытки реорганизовать работу медицинского учреждения, ввести новые методы лечения и обследования

- a. включают все перечисленное
- b. обусловлены исключительно альтруистическими мотивами
- c. могут приводить к конфликту**
- d. обычно приветствуются всеми членами коллектива
- e. способствуют сплоченности коллектива

К проявлениям синдрома выгорания относят

- a. сомнения в правильности выбранной профессии
- b. разочарование и недовольство своими достижениями
- c. эмоциональное истощение
- d. все перечисленное**
- e. раздражение и формализм в отношении пациентов

Физические жалобы при синдроме выгорания включают в себя

- a. все перечисленное**
- b. колебания АД
- c. боль в мышцах и суставах
- d. обострение психосоматических заболеваний
- e. нарушение аппетита и сна

Важнейшим фактором профилактики эмоционального выгорания считают удовлетворение потребности в

- a. понимании
- b. переживаниях
- c. аффилиации
- d. доминировании
- e. самореализации**

К факторам, связанным с повышенным риском синдрома эмоционального выгорания у врачей, относят все, кроме

- a. неэффективного руководства
- b. быстрого карьерного роста**
- c. отсутствие возможности служебного и личностного роста
- d. высокой напряженности работы, отсутствия необходимого отдыха
- e. монотонности труда, нечеткости поставленной цели

Чтобы избежать инновационного конфликта, необходимо

- a. иметь несколько альтернативных планов реализации проекта
- b. осуществлять обновления поэтапно
- c. подробно оповещать коллектив обо всем происходящем
- d. все перечисленное**
- e. обсуждать преимущества и недостатки проекта с коллективом

Достижению самореализации препятствует

- a. написание рекомендаций и руководств
- b. карьерный рост

- c. чтение лекций
- d. освоение новых методик и технических средств
- e. отчаянная борьба за собственный престиж**

Синдром хронической усталости включает в себя

- a. нарушение внимания
- b. обмороки
- c. раздражительность, расстройство сна
- d. все перечисленное**
- e. мышечную слабость

Для профилактики эмоционального выгорания и хронической усталости важно

- a. регулярно отдыхать
- b. не замечать собственные ошибки
- c. делиться своими мыслями с семьей и коллегами**
- d. полностью отдаваться работе
- e. делать все перечисленное

Чувство стыда связывают с неудовлетворенной поспебностью

- a. принижать себя
- b. принадлежать к группе
- c. в доминировании
- d. в переживаниях
- e. соответствовать общественной норме**

Потребности в автономии, постоянстве образа "Я", понимании характерны для типа акцентуации личности

- a. гипертимного
- b. демонстративного
- c. интровертированного**
- d. гипотимного
- e. педантичного

Стремление к автономии характерно для людей

- a. интровертированных**
- b. эгоцентричных
- c. с преобладанием первой сигнальной системы
- d. с заниженной самооценкой
- e. демонстративных

Стремление найти оправдания своим действиям, переложить вину за собственную ошибку на кого-либо другого или объяснить плохой исход неудачными обстоятельствами считают проявлением потребности в

- a. положительной самооценке**
- b. доминировании
- c. аффилиации
- d. понимании
- e. переживаниях

Неудовлетворенность может быть следствием

- a. всего перечисленного**
- b. несоответствие результата собственным заслугам
- c. ничего из перечисленного
- d. неоправдавшихся ожиданий
- e. сравнения своих и чужих достижений

При сравнении с окружающими наибольшую неудовлетворенность испытывают люди

- a. гипотимные
- b. с преобладанием второй сигнальной системы
- c. экстравертированные
- d. с повышенной самооценкой**
- e. альтруистичные

Потребность в понимании наиболее выражена у людей

- a. альтруистичных
- b. гипотимных
- c. экстравертированных
- d. в повышенной самооценкой
- e. с преобладанием второй сигнальной системы**

Аффилиация-это стремление к

- a. положительной самооценке
- b. самореализации
- c. отстаиванию своих принципов
- d. общению**
- e. покровительству

Во время длительного лечения,особенно в условиях изоляции пациенты чаще испытывают потребность в

- a. отстаивании своих принципов
- b. положительной самооценке
- c. понимании
- d. эксгибиции
- e. переживаниях**

Потребности в общении и эксгибиции,положительной самооценке,доминировании характерны для типа акцентуации личности

- a. педантичного
- b. интровертированного
- c. демонстративного**
- d. застревающего
- e. гипотимного

Чувство вины,утраты собственного достоинства,муки совести вызывает ущемление потребности в

- a. отстаивании своих принципов**
- b. общении
- c. самореализации
- d. понимании
- e. положительной самооценке

Самой важной является потребность человека

- a. сохранить свою жизнь**
- b. в самореализации
- c. отстаивать свои интересы
- d. в общении
- e. в положительной самооценке

Страх смерти чаще всего

- a. мешает использовать психологическую защиту
- b. дезорганизует мышление человека**
- c. заставляет человека обратиться к врачу
- d. все варианты верны
- e. резко выражен у дистимичных личностей

Стремление принижать себя чаще характерно для больных с

- a. алкоголизмом
- b. шизофренией
- c. маниакальным синдромом
- d. депрессией**
- e. наркоманией

Для гипертимного типа акцентуации личности характерны потребности в

- a. доминировании, общении и эксгибиции
- b. автономии, понимании
- c. принижении себя, избегании неудач
- d. переживаниях, физиологическом комфорте**
- e. переживаниях, положительной самооценке

Для предотвращения неудовлетворенности, вызванной неоправданными ожиданиями необходимо

- a. все перечисленное**
- b. описать промежуточные результаты, ожидаемые на каждом этапе лечения
- c. посвятить больного в планы и намерения врача
- d. расспросить пациента о представлении по поводу планируемого лечения
- e. расспросить пациента о его важнейших ценностях и потребностях

Интравертированные и педантичные личности обычно проявляют стремление к

- a. принадлежности к группе
- b. соответствию общественной норме
- c. автономии**
- d. порядку
- e. достижению успеха

Чувство скуки указывает на неудовлетворенную потребность в

- a. понимании
- b. переживаниях**
- c. доминировании
- d. аффилиации
- e. положительной самооценке

Перфекционизм считают типичной чертой людей

- a. гипотимных
- b. возбудимых
- c. гипертимных
- d. демонстративных
- e. педантичных**

При возникновении острого заболевания пациенты чаще испытывают потребность в

- a. отстаивании своих принципов
- b. общении
- c. понимании**
- d. доминировании
- e. переживаниях